

1895

Bericht

über die von Mai 1887 bis März 1894
in der Halleschen Frauenklinik ausgeführten
Prolapsoperationen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie

welche

mit Genehmigung der hohen medicinischen Fakultät

der

vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

zugleich mit den Thesen

Mittwoch, den 3. April 1895, Mittags 12¹/₂ Uhr

öffentlich verteidigen wird

Max Kieme

aus Heygendorf (Sachsen-Weimar).

Referent: Herr Prof. Dr. Fehling.

Opponenten:

Herr F. Rosahl, Cursist.

Herr E. Hundertmarck, Dr. med.



Halle a. S.,
Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.
1895.

Imprimatur
Prof. Dr. **Bernstein**
h. t. Decanus.

Seiner lieben Mutter

in Dankbarkeit.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Wenn man die Handbücher der Frauenheilkunde durchsieht, so findet man in jedem eine grosse Anzahl Seiten der Behandlung der Gebärmutter-Scheidenvorfälle gewidmet; waren doch schon die Gynaekologen der alten Zeit bestrebt, vor allem dieses Leiden, welchem geradezu soziale Bedeutung beizumessen ist, durch therapeutische Massnahmen der verschiedensten Art zu heben. Freilich ist eine Heilung nicht immer leicht; und die wunderbarsten Methoden wurden ausgedacht und ausprobiert, ohne dass irgend einer besondere Erfolge zu verzeichnen gehabt hätte.

Welch ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen der seiner Zeit epochemachenden Episiorrhaphie Frickes, bei der zum Zwecke der Verengerung der Schamspalte nach voraufgegangener Anfrischung der medianen Fläche beider grosser Schamlippen die Seiten des Scheideneingangs durch die blutige Naht vereinigt wurden, und zwischen der Applikation der mannigfaltigsten Ätzmittel auf die erschlafften Wände der Scheide zur Wiederherstellung ihrer jungfräulichen Enge!

Die Vorkämpfer dieser Richtung, wie die jener vermeinten, den armen geplagten Frauen, welche nach den Schrecken der Geburt auch noch deren Folgen zu tragen hatten, die ersehnte Hülfe zu bringen. Wohl hatte der eine oder der andere der Operateure einen leidlichen Effekt erzielt, doch im ganzen und grossen war das Endresultat keineswegs ein solches, dass man befriedigt die Hände in den Schoss hätte legen können.

So lagen die Verhältnisse eine Reihe von Jahren, bis die neuere Zeit neuere, bessere und humanere Behandlungsmethoden und mit ihnen bessere Resultate brachte.

Es soll nun nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle alle die gegen Prolapse angegebenen Operationen aufzuzählen, ich will mich vielmehr auf die neueren und neuesten beschränken, soweit sie in den Rahmen dieser Abhandlung gehören, d. h. auf diejenigen, welche unter R. Kaltenbach und nach dessen allzufrühem Tode unter dem interimistischen Direktoriat des Herrn Prof. von Herff von Mai 1887 bis März 1894 in hiesiger Klinik zur Herstellung einer engen Scheide, eines festen, widerstandsfähigen Beckenbodens am meisten in Anwendung gewesen sind, und sodann will ich einen Überblick über sämtliche 233, hierher gehörige Operationen geben, denn aus statistischen Berichten ersieht man am ehesten, ob eine Methode ideal zu nennen ist oder noch der Vervollkommnung bedarf. Ich komme somit gern der Aufforderung meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Prof. Fehling nach, einen bescheidenen Beitrag zu diesem so wichtigen Kapitel der Gynaekologie zu liefern, zumal meines Wissens noch nicht viele grössere statistische Mitteilungen über Prolapsoperationen aufgestellt resp. der Öffentlichkeit übergeben sind.

Es folge hier nun zuerst eine kurze Besprechung der Amputatio colli infravaginalis nach Kaltenbach. Das Verfahren ist folgendes: Die Frau befindet sich in Kreuz-Rückenlage. Nach vorausgegangener gründlicher Desinfektion der äusseren Genitalien und der Scheide wird die portio mit Hakenzangen, so weit als möglich, herabgezogen. „Sodann werden zuerst“, um Kaltenbachs Worte zu gebrauchen, „beide Muttermundswinkel bis zum Scheidenansatze mittelst einer über die Fläche gekrümmten Scheere gespalten. Dann zieht man die vordere Muttermundslippe nach vorn an und schneidet sie keilförmig in der Weise heraus, dass zwei von seiten des Cervicalkanals und des Scheidengewölbes schräg nach aufwärts convergierende Querschnitte

etwa in der Mitte der vorderen Cervicalwand zusammen-
treffen. Die so entstandenen vorderen und hinteren Lappen
werden durch umfassende Nähte vereinigt. In entsprechender
Weise wird die hintere Muttermundslippe excidiert und
vernäht. Zuletzt werden die bis ins Scheidengewölbe her-
einreichenden Seitenschnitte durch einige Hefte verschlossen.“
Während als Indikation für die eben erwähnte Methode
besonders Hypertrophie der portio mit mässiger Elongation
des collum und Hyperplasie des submucösen Vaginalgewebes
anzuführen ist, kommt die hohe Excision des collum
namentlich dann in Frage, wenn der Uterus eine Sonden-
länge von mindestens 12 cm aufweist. Das Operations-
verfahren bei letzterer ist folgendes: Mittels Constriction
des ganzen vor der Schamspalte liegenden Prolapses durch
elastische Ligatur wird fast völlige Blutleere erzeugt. „Nach
circulärer Umscheidung des Scheidenansatzes dringt man“,
um nochmals Kaltenbachs Worte zu citieren, „mit stark
nach innen und oben convergierenden Schnitten gegen das
superavaginale collum vor; dasselbe lässt sich leicht mit
Messer oder Scheere, z. T. stumpf durch Zug aus seiner
Umgebung auslösen. Darauf Spaltung desselben mittels
einer in den Cervicalkanal eingeführten Scheere in eine
vordere und hintere Hälfte und Abtragung jeder Cervical-
wand für sich mit Erhaltung kleiner, halbmondförmiger
Lappen, die mit den Vaginalwundrändern zusammengenäht
werden. Dann beiderseits Excision dreieckiger Lappen
aus der invertierten Scheide und Vernähung der so ent-
standenen Wunden zwecks exakter Blutstillung.“ Welch'
grossen Werth die Methode hat, ist sofort klar; auch
Fehling erwähnt die Operation als eine dankbare und
spricht der so erzielten Verengung der seitlichen Scheiden-
gewölbe von vorn nach hinten eine Bedeutung zu.

Es mögen nun die Operationen folgen, bei denen die
Scheide für sich allein oder zusammen mit einer Damm-
plastik in Angriff genommen wird.

Was die Kolporrhaphia anterior betrifft, die allein nur in wenigen Fällen ausgeführt wird, so ist sie indicirt, wenn die vordere Scheidenwand beutelartig prolabiert, mit oder ohne gleichzeitig bestehende Cystocle; sehr häufig wird sie mit der Kolpoperineorrhaphie combinirt. Das Verfahren ist folgendes: Die Frau befindet sich in Steiss-Rückenlage. Nach sorgfältiger Desinfektion Freilegung und Spannung des Operationsfeldes durch etliche an der Peripherie des zu excidierenden Lappens eingesetzte Kugelzangen. Sodann präpariert man den Lappen nach Ausführung der Grenzschnitte von seiner Unterlage los, indem man besonders darauf achten muss, dass man die Spitze des Bistouris nach dem Lappen zu richte, um nicht zu tief einzudringen und benachbarte Teile zu verletzen. Dann folgt die sehr peinlich auszuführende Naht. Die Form und die Ausdehnung der Anfrischung ist noch keine einheitliche; neuerdings ist, — wie auch in hiesiger Klinik — besonders nach dem Vorbilde von Simon und Hegar, die ovaläre Figur gewählt.

Selten wird auch die Kolporrhaphia posterior allein ausgeführt; eine Indikation finden wir nach Hofmeier in Fällen von isolierter Erschlaffung und Vorfalle der oberen Partie der hinteren Vaginalwand mit Rectocele bei gleichzeitiger Beteiligung des Beckenbodens, und dann nach Hegar noch in Fällen, in denen der Prolaps der hinteren Wand durch ein hochgradiges, hypertrophisches Ectropium der Mucosa und Submucosa formirt ist; hier würde nämlich durch die vielleicht sonst in Betracht kommende Kolpoperineorrhaphie eine immens grosse Wunde gesetzt. Die Operation wird nun in der gleichen Weise vorgenommen wie die Kolporrhaphia anterior, der excidierte Lappen hat die Form einer Ellipse oder auch einer Raute. Mehr empfohlen aber wird die Ausschneidung kleinerer oder grösserer Schleimhautpartieen aus der seitlichen Vaginalwand, so dass wir anstatt der Kolporrhaphia posterior so zu sagen eine Kolporrhaphia duplex posterior erhalten. Und in den weitaus

häufigsten Fällen wird die Operation mit der Perineorrhaphie vereinigt, wobei allerdings die Anfrischungsfläche eine bedeutend grössere, aber der Erfolg auch ein umso besserer wird.

Die Kolpoperineorrhaphie nun ist eine der nützlichsten Operationen in der ganzen Gynaekologie und hat wohl bei allen Operateuren der Jetztzeit die grösste Verbreitung erlangt. Die Operation ist eine plastische, mit Hereinziehung benachbarter Gewebsteile, sagt Hegar von ihr; und Fehling charakterisiert kurz die Methode mit den Worten: Es wird durch das ausgeschnittene Dreieck ein Teil des bei grossen Prolapsen überschüssigen Gewebes abgetragen, und die Scheide bekommt dadurch wieder die Richtung von hinten oben nach vorn unten, statt senkrecht nach abwärts zu laufen.

Auch sie wird von den verschiedenen Operateuren modifiziert; allen Methoden jedoch gemeinsam ist die Excision eine Wundfläche aus der hinteren Wand.

Vor jeder Kolpoperineoauxesis muss man sich die Frage vorlegen, ob der Vorfall gross oder klein ist, ob eine oder beide Vaginalwände prolabiert sind, um sich danach einzurichten. Man wird dann z. B. bei Vorfall der vorderen Wand mit grosser Cystocele eine breitere Anfrischung nach der Vulva hin vornehmen; bei ausgedehntem Prolaps der hinteren Wand ev. eine Elythrorrhaphia posterior vorausschicken. Für Fälle leichten Grades genügt nach Hegar die Excision eines Dreiecks von ca 4—5 cm Breite und 5 cm Höhe, für hochgradige Fälle mag der Grenzschnitt an der Basis des Dreiecks 7 cm lang werden, die Höhe der anzufrischenden Partie 9 cm betragen. Eine genaue Bildung des Operationsverlaufs giebt Hegar in der „operativen Gynaekologie.“ Nachdem er die Vorbereitungen besprochen hat, fährt er fort: „Als Körperposition dient eine gewöhnliche Steinschnittlage. Zuerst wird der obere Wundwinkel mit einer Zange gepackt und nach oben und vorn gezogen, so dass nun die hintere Vaginalwand im

Eingang dem Operateur nahezu senkrecht gegenüber steht. Zwei andere Zangen werden dann je 3—4 cm von der Raphe des Damms entfernt, in die untere Partie der grossen Schamlippen eingesetzt. Es folgt dann die Ausführung der seitlichen Grenzschnitte und die Abpräparierung des Lappens. Man kann nun z. T. durch Zug den Lappen von seiner Unterlage lostrennen, teilweise mit dem Bistouri, dessen Spitze stets gegen jenen gekehrt sein muss. Ist die Blutung stark und hindert sie am Sehen, so lässt man unter geringem Drucke irrigieren. Ist die Höhe der hinteren Commissur erreicht, so hebt man mit der einen Hand den Lappen in die Höhe und macht den Grenzschnitt längs der hinteren Commissur. Einige Messerzüge genügen, um den Lappen völlig zu entfernen. Es erfolgt nun die Glättung mit der Scheere, wobei die in den Mastdarm eingeführten Finger die Wundfläche vordrängen. Die Wunde wird dann abgespült; grössere, blutende Gefässe ligiert. Sodann erfolgt die Anlegung der Suturen. Durchaus notwendig erscheint die Anlegung einer Anzahl tiefer, den ganzen Grand der Wunde durchsetzenden Nähte, damit keine Ansammlung von Blut und Wundsekret zustande komme. Zur festen Schliessung der äusseren Wundränder sind ferner noch oberflächliche Fäden nötig. Die Naht beginnt an der Spitze.“

Fehling spricht sich in seinem „Lehrbuche der Frauenkrankheiten“ über diese Methode sehr befriedigend aus; sie liefert nach seiner Ansicht zweifellos für die meisten, selbst sehr schweren Fälle von Vorfall ausgezeichnete Resultate, so dass er die anderen Methoden nur gelegentlich versucht hat; und so reden mit ihm Hofmeier und viele andere Gynaekologen.

Natürlich soll damit nicht etwa die Behauptung aufgestellt werden, dass bei jedem Prolaps die Kolpoperineorrhaphie die einzig wahre Methode sei; denn gerade bei der Behandlung dieses Leidens heisst es: Nicht schematisieren, sondern individualisieren! Vor jeder Operation

müssen die Entstehungsursachen des Prolapses, sein Grad, etwa hinzukommende Complicationen von seiten der Genitalien oder anderer Organe, das Alter und der Allgemeinzustand der Patientin, sowie ihre Familienverhältnisse genau ins Auge gefasst werden, um dann das passende Verfahren auszuwählen.

Von diesem Standpunkte aus sind auch in hiesiger Klinik alle Operationen vorgenommen, und während bei einer Kranken nur eine Hülfsoperation, z. B. nur eine Keilexcision einer oder beider Muttermundslippen nötig war, musste bei einer anderen die Kolpoperineorrhaphie im Verein mit der Kolporrhaphia anterior gemacht werden, war bei einer dritten sogar die Totalexstirpation des Uterus nicht zu umgehen.

Die Operationen sind zum kleineren Teile von Kaltenbach selbst ausgeführt und zwar dann meist nur die schweren Fälle oder die Recidive, die meisten anderen von den Assistenten.

Im Folgenden will ich nun noch etwas näher auf die 233 Operationsfälle eingehen, namentlich aber die Combination der verschiedenen Methoden, die Nachbehandlung, den Heilungsverlauf, den momentanen Effekt bei der Entlassung und das gegenwärtige Befinden etwas beleuchten.

Wenn ich vorher kurz noch auf den Grad der Vorfälle eingehen darf, so finden wir, dass

I. der Uterus allein in 5 Fällen,

II. die Vagina allein in 128 Fällen,

III. Uterus und Vagina zusammen in 100 Fällen prolabiert oder descendiert waren, und zwar verteilen sich diese Zahlen, wie folgt:

I. Uterus

1. descensus in 2 Fällen,

2. prolapsus „ 3 „ ;

II. Vagina

1. descensus

a. vag. ant. in 11 Fällen,

b. vag. post. „ 8 „ ,

c. vag. ant. et post. in 29 Fällen;

2. prol. u. inversio
 - a. vag. ant. in 13 Fällen,
 - b. vag. post. „ 8 „ ,
 - c. vag. ant. et post. in 55 Fällen;
 3. prol. vag. ant. et desc. vag. post. in 3 Fällen,
 4. prol. vag. post. et desc. vag. ant. in 1 Falle.
- III. Uterus u. Vagina.

1. prol. uteri et vag. total. in 28 Fällen,
2. „ „ „ „ incomp. „ 24 „ ,
3. prol. uteri et inv. vag. „ 10 „ ,
4. „ „ „ desc. vag. „ 4 „ ,
5. desc. uteri et prol. vag. „ 24 „ ,
6. „ „ „ desc. vag. „ 12 „ .

Wie die verschiedenen Operationsverfahren in der verschiedensten Weise combinirt wurden, erhellt am besten aus der kleinen, folgenden Tabelle, in welcher ich der bequemerem Übersicht wegen, wie später am Ende dieser Abhandlung auch in dem Überblick über sämtliche 233 Fälle, alle Operationen in sechs Hauptgruppen einteile, von denen einige wieder in Unterabteilungen zerfallen:

Operationsmethode.	Zahl der Operationen:
I. Kolporrhaphia anterior	3;
II. Kolpoperineorrhaphia	24
1. Einfache Kolpoperineorrhaphia	22
2. Kolporrh. post. u. Kolpoperineorrh.	1
3. Kolpoperineorrh. u. Neugebauers Methode	1;
III. Kolporrhaphia ant. u. Kolpoperineorrhaphia	125
1. Kolporrh. ant. et post.	39
2. Kolporrh. ant. u. Kolpoperineorrh.	69
3. Kolporrh. ant. et post. u. Kolpoperin.	1
4. Kolporrh. ant. u. Perineopl. nach Tait	10
5. Kolp. ant. et. post. u. „ „ „	1
6. Kolp. ant. et Kolpoperin. u. Perineopl. n. Tait	1
7. Kolp. ant. u. Kolpoperineorrh. u. K. dupl. post.	4;

	Zahl der Operationen:
IV. Kolporrh. ant. et post. mit Dammplastik u. Amput. colli infravaginalis	46
1. Kolporrh. ant. u. Amp colli infravag.	4
2. Kolporrh. ant. u. Amp. colli infravag. u. Perineopl. n. Tait	2
3. Kolporrh. post. u. Amp. colli infravag.	3
4. Kolporrh. ant. et post. u. Amp. colli infravag.	15
5. Kolporrh. ant. u. Kolpoperin. u. Amp. c. infravag.	21
6. Kolpoperineorrh. u. Amp. colli infravag.	1;
V. Kolporrh. ant. et post. mit Dammplastik u. Amput. colli supravaginalis	31
1. Kolporrh. ant. u. Amp. colli supravag.	1
2. Kolporrh. post. u. Amp. colli supravag.	1
3. Kolporrh. ant. et post. u. Amp. colli supravag.	3
4. Kolp. ant. u. Amp. c. suprav. u. Perineopl. n. Tait	1
5. Kolp. ant. u. Kolpoperin. u. Amp. c. supravag.	25;
VI. Perineoplastik	4
1. nach Tait	3
2. Modif. n. Küstner	1.

Es sind nun in 7 Jahren 233 Operationen zur Erzielung resp. Wiederherstellung eines ausreichenden Scheidenschlussapparates ausgeführt worden; in 77 Fällen waren sie mit einer Hilfsoperation an der Vaginalportion vereinigt. Diese 233 Fälle verteilen sich auf die Berichtsjahre, wie folgt:

Jahr:	Zahl der Fälle:
1887, 15. Mai bis 31. Dezember	15.
1888, 1. Januar „ „ „	43,
1889, „ „ „ „ „	29,
1890, „ „ „ „ „	35,
1891, „ „ „ „ „	26,
1892, „ „ „ „ „	36,
1893, „ „ „ „ „	35,
1894, „ „ „ 31. März	14.

Die 233 Operationen sind an 225 Frauen vorgenommen, 8 nämlich von denselben unterzogen sich innerhalb unserer Beobachtungszeit wegen eines bald p. op. eingetretenen Recidivs einer nochmaligen Operation. An 7 Patientinnen, welche schon auswärts oder z. T. auch in hiesiger Klinik vor dem Jahre 1887 wegen Vorfalls operiert waren, wurde eine Operation des Recidivs ausgeführt; eine davon hatte Recidiv nach 3 Jahre früher gemachter Ventrofixation. Ausser den 225 Kranken, die hier operiert wurden, wurden in dem oben erwähnten Zeitraume wegen Vorfalls noch weitere 29 Frauen aufgenommen; von denen wurden 20 ohne Operation, meistens mit Pessar, einige ohne jede Behandlung wieder entlassen, z. T. wegen zu geringer Beschwerden, z. T. wegen Decrepidität, z. T. wegen complicierender maligner Abdominaltumoren etc.; die restierenden 9 wurden einer anderen Therapie unterworfen, d. h. es wurde 2 mal die vaginale Totalexstirpation des Uterus vorgenommen, 1 mal die Myomotomie, 4 mal die Ventrofixation (mit gleichzeitiger Ovariectomie), 1 mal Keilexcision beider Muttermundlippen, 1 mal Massage nach Thure Brandt.

Bezüglich der oben erwähnten 225 Frauen, an denen die Kolporrhaphie ausgeführt ist, habe ich noch zu bemerken, dass von diesen 22 ledig waren; nicht geboren hatten nur 7 Patientinnen, und zwar gehörten 6 davon zu den Unverheirateten.

Betreffs des Lebensalters, in dem die Kranken zur Zeit der Operation standen, ist, soweit die Journale darüber Auskunft erteilen, folgendes zu konstatieren: 1 Pat. war 19 jährig; die übrigen verteilten sich auf die einzelnen Dezennien, wie folgt:

49	standen	zwischen	20—30	Jahren,
56	„	„	31—40	„
78	„	„	41—50	„
38	„	„	51—60	„
8	„	„	61—70	„ ;

über 70 Jahre war keine Patientin alt. Die meisten hatten sich also um die Zeit des Klimakteriums der Operation unterzogen.

Bezüglich der etwa die Operation complicierenden Erosionsflächen und Geschwüre an der Portio oder an der Vaginalwand darf ich vielleicht an dieser Stelle einige Worte sagen. Dieselben wurden, besonders wenn sie einen beträchtlichen Umfang hatten, nach Reposition des Prolapses mit Tanninglycerintampons, mit welchen sie überdeckt wurden, zur Heilung gebracht, ehe man zur Operation schritt; oder sie wurden cauterisiert oder mit concentr. Carbolsäure geätzt und dann, wenn möglich, mit excidiert. Andere zufällig bestehende Genitallaffektionen wurden nach den allgemein gültigen Regeln behandelt.

Als Nahtmaterial wurde bei allen diesen Prolapsoperationen für die Amputationen der Portio durchschnittlich Seide, für die Kolporrhaphieen und Dammplastiken tiefe Draht- und oberflächliche Catgutnaht verwandt.

Die Nachbehandlung war eine einfache. Die Patientin musste ruhige Rückenlage einnehmen. Die Ernährung war keine andere als die der anderen Kranken. Katheterismus wurde nur in zwingenden Fällen angewandt; auf Zureden oder durch Nachhelfen mit warmen Kataplasmen konnten die Operierten doch in der Mehrzahl der Fälle schliesslich noch spontan urinieren. Stuhlgang wurde, wenn nötig, am 4. Tage durch Ricinusöl oder durch Calomelpillen erzielt. Scheidenirrigationen mit 2^oiger Carbolsäurelösung, mit Kal. permang. Borsäure oder Sublimat wurden nur bei vermehrter Sekretion und foetidem Fluor angewandt, bisweilen wurden sie mit Sitzbädern vereinigt. -- Bei Ödem der Labien wurden Wattebäusche, die in Sublimat (1 : 1000) angefeuchtet waren, vor die Vulva gelegt. — Einige Male auftretende Nachblutungen aus einer durch Auseinanderweichen der Wundränder entstandenen Gewebslücke wurden durch Umstechung gestillt; ein Mal genügte Jodoformgazetamponade. Etwa sich bildende kleine Eiterherde wurden incidiert, mit Jodoformgaze drainiert.

Vom 9.—10. Tage an wurden im Durchschnitt die Dammnähte entfernt, die Suturen aus der Vagina und Portio später.

Vom 14. Tage an wurde die Rekonvalescentin entlassen mit der Weisung, vorerst schwere körperliche Anstrengungen, den coitus zu meiden, Sorge für leichten Stuhl zu tragen, bei lebhafter Sekretion eventuell Spülungen zu machen und in 4—6 Wochen zur Herausnahme der noch liegenden Nähte sich wieder vorzustellen. Ausdrücklich wurde ihr noch eingeschärft, falls sie nach der Operation noch einmal schwanger würde, auf alle Fälle bei der Entbindung ärztliche Hilfe hinzuzuziehen.

Die Heilung erfolgte in den meisten Fällen per primam intentionem; in zahlreichen Beispielen schnitten einige Fäden durch; es bildeten sich dann gewöhnlich gute Granulationen. In einigen Fällen, in welchen die Nähte arg durchgeschnitten waren, so dass die Wundränder weit klafften und keine Aussicht auf sekundäre Vernarbung bestand, wurden die vorhandenen Granulationen mit dem scharfen Löffel abgekratzt und zum Zwecke rascherer Verheilung mit ferrum candens oder lapis touchiert; in 3 Fällen wurde die Sekundärnaht angelegt.

Temperaturerhöhungen leichter Art, wenn ich 38,0 schon als Erhebung bezeichnen will, waren ziemlich häufig; und zwar besonders am 1. und 2. Abend nach der Operation; am Morgen des 3. oder 4. Tages war die Temperatur wieder zur Norm abgefallen. Höhere Fiebersteigerungen werden weniger beobachtet; z. T. waren sie veranlasst durch die unten anzuführenden Complicationen von Seiten anderer Organe, z. T. auch durch lokale Irritationen, z. B. durch Bildung eines kleinen Infiltrats der Wundränder, durch Ödem der Labien, durch ein Hämatom am Damm; einige Male war keine Aetiologie aufzufinden. Ein Mal war eine Patientin nachts, 4 Tage p. op., eigenmächtig aufgestanden, so dass sie am Morgen des 5. Tages 39,5 hatte.

Einen völlig reactionslosen, fieberfreien Verlauf nahmen 124 Fälle; bei denen war auch kein einziger Faden eingeschnitten. Bei einigen ist über den Verlauf nichts notiert, von denen muss ich natürlich absehen.

Ein Mal wurde der Heilungsverlauf compliziert durch hinzukommende Parametritis dext. et post., ein Mal durch die eintretende Menstruation, während sonst stets in der intermenstruellen Zeit operiert wurde.

Auch durch Affektionen anderer Organe wurde die Rekonvalescenz des öfteren gestört resp. in die Länge gezogen, nämlich

- | | | | |
|---|-----|-------|---------------------------|
| 1 | Mal | durch | Trigeminusneuralgie, |
| 1 | " | " | Stomatitis, |
| 1 | " | " | Angina follicularis, |
| 1 | " | " | Pleuritis duplex, |
| 2 | " | " | Pneumonie, |
| 3 | " | " | Bronchitis, |
| 1 | " | " | Gastroenteritis, |
| 1 | " | " | Furunkulosis, |
| 1 | " | " | Gelenkrheumatismus, |
| 2 | " | " | Thrombophlebitis femoris. |

Todesfälle sind 2 zu verzeichnen.

Der 1. Fall betraf eine 49jährige Frau, welche am Abend des 1. Operationstages 39,6 Temp., 110 Pulse hatte, zugleich starken Schüttelfrost. Die Diagnose lautete auf Pneumonie des linken Unterlappens. Am 11. Tage wurden die Nähte aus der gut aussehenden Wunde entfernt. Am 21. Tage erfolgte unter zunehmendem Marasmus der exitus letalis. Die Sektion ergab: Pneumonia gangraenesc. lob. inf. med. pulm. sin.

Der 2. Fall betraf eine 52jährige Frau, die am Abend des 6. Tages p. op. 38,2 Temp. hatte, über Frösteln, Kopfweh, Druck in der Magengegend klagte; im Wundbereich fehlten alle Schmerzen. Am 7. Tage Mittags 40,4. Wunde mässig gerötet, eine mittlere Damмнаht durchgeschnitten, daselbst kleine, dreieckige, graubelegte Wundfläche; abends

41,0; Puls 104 pro Minute, voll; Wunde stärker gerötet; Ödem des labium min. sin.; 2 Mal Erbrechen. Entfernung einiger Dammnähte, Auflegen von Sublimatwattebäuschen; Coffein. natr.-salicyl., Weinklysmen, Morph. subkutan; Urin ohne Albumen. Am 8. Tage; Temp. 39,9—40, 1—40,4; Puls 132—108—120. Wunde besser aussehend, Ödem fast geschwunden; Urin enthält zahlreiche Cylinder. P. ist komatös. Injektion der Conjunctivalgefäße. An der letzten Phalange des 4. Fingers der linken Hand zwei kleine, dunkelblaue, schmerzhaft Stellen. — Analeptika. — Am 9. Tage exitus letalis. — Wir haben hier eine von der Wunde ausgehende Infektion und Intoxikation mit sekundären Erscheinungen in Nieren und Gehirn. Die Sektion ergibt: Endocarditis ulcerosa, embolische Abszesse in Pia und Hirnrinde. Wunde, besonders die am Muttermund und die der Kolporrhaphia anterior, schmutzig-diphtherisch aussehend. Keine Thromben in den periproktalen und perivaginalen Venen und denen des lig. latum.

Nunmehr will ich noch einige Bemerkungen an die einzelnen Operationsmethoden knüpfen, auch einzelne, beachtungswerte Fälle mit Rücksicht auf ihren Verlauf, ihren Ausgang etwas beleuchten.

Ueber die Kolporrhaphie anterior ist nichts Besonderes zu sagen. Sie wurde nur 3 Mal allein bei isoliertem Vorfall der vorderen Scheidenwand ausgeführt. Der Heilungsverlauf war in allen 3 Fällen ein reactionsloser, der primäre Erfolg ein guter; jedoch 2 der Operierten bekamen nach schwerer Entbindung Recidiv, von denen eine sich 4 Jahre nach der ersten Operation einer zweiten unterzog und seitdem völlig geheilt ist; der Zustand der anderen ist ganz erträglich; die dritte ist vor 2 Jahren gestorben, so dass nähere Angaben fehlen.

Die Kolpoperineorrhaphie wurde in 24 Fällen ausgeführt, und zwar 22 Mal die gewöhnliche Kolpoperineorrhaphie, meistens nach Hegars Vorschrift; nur 6 Mal

näherte sich die Anfrischung der bei einer Elythrorrhaphia posterior üblichen; fast stets wurde aber auch hierbei der Damm in das Operationsbereich hineingezogen. Einige wenige Male wurde nach Doléris operiert, selbstverständlich nur in Fällen leichteren Grades; denn, wie auch Fehling sagt, genügt diese Anfrischung bei schweren Fällen, bei denen eine starke Verengerung der hinteren Vaginalwand mit Dammneubildung zu erzielen ist, keineswegs. — Ein Mal wurde neben der typischen Kolpoperineorrhaphie noch eine Kolporrhaphia post. gemacht, und ein Mal zugleich das Neugebauersche Verfahren angewandt. Sehr oft wurde sowohl hier als auch noch weiterhin als Nebenoperation die Emmetsche Operation der Cervicalrisse gemacht, welche ich in der tabellarischen Uebersicht nur der Vollständigkeit halber mit aufführe, sonst jedoch übergehe. Die Hauptindikation für die Kolpoperineorrhaphie gab natürlich ein Vorfall der hinteren Wand ab, doch ein Mal bestand auch nur descensus uteri senilis, ein Mal nur descensus vag. anterior. . Auffallend häufig war zugleich ein incompleter, alter Dammriss vorhanden. Der Verlauf war in allen Fällen fast ausnahmslos ein guter; einige Male traten infolge intercurrenter Lungenaffektionen geringe Temperatursteigerungen auf. Sowohl der primäre wie der definitive Erfolg war im allgemeinen zufriedenstellend. Drei Mal diente die Kolpoperineorrhaphie als Recidivoperation nach vorausgegangener Kolporrhaphia ant. et post. resp. nach Ventrofixation und konnte 2 Mal auch einen Dauererfolg aufweisen; im 3. Falle allerdings hat sich wieder ein Prolaps beider, vornehmlich der hinteren, Vaginalwände eingestellt. Ein Fall bietet vielleicht ein besonderes Interesse deshalb, weil sich bei ihm ein übler Zufall ereignete. Es wurde nämlich wegen der Anwesenheit von Phosphatsteinen im Vaginalreservoir, die sich nach partieller Kolpokleisis gebildet hatten, neben der Kolpoperineoplastik eine Lithotomia vaginalis vorgenommen und bei dem Abpräparieren des Lappens an der hinteren

Wand der Douglassche Raum eröffnet; allerdings trug die Pat. keinen grösseren Nachteil davon, als dass sie am Abend des 2. Tages p. op. 38,2 Temp. hatte, ohne irgendwelche Störungen im Allgemeinbefinden oder in der Wundheilung zu zeigen. Übrigens war die Operation nicht von Erfolg begleitet, denn bald bildete sich wieder ein Vorfall der vorderen Wand aus, um dessentwillen am 1. V. 1894 die Kolpoperineorrhaphie zusammen mit der Kolporrhaphia ant. ausgeführt wurde, und trotz guter primärer Heilung war schon vor 3 Monaten wieder ein Recidiv der vorderen Wand zu konstatieren. Es ist überhaupt ein nicht seltenes Vorkommnis, das eine Frau, die schon einmal kolporrhaphiert ist, und sich dann wegen Recidivs einer zweiten derartigen Operation unterzieht, auch nach glücklicher Überstehung dieser nicht geheilt bleibt, so dass schliesslich, wenn sie sich nicht durch Anwendung eines Pessars über ihren Zustand hinwegzutäuschen vermag, nur noch als ultimum refugium die Totalexstirpation des Uterus übrig ist.

In einem Falle wurde, wie schon erwähnt, die Kolpoperineoplastik mit der Kolporrhaphia post. kombiniert, weil man durch die Anfrischungsfigur der letzteren ein mächtiges Geschwür der hinteren Wand zugleich entfernen konnte; der Erfolg ist bis jetzt ein guter; freilich sind erst 9 Monate seit der Operation verflossen.

In den weiteren 125 Fällen, welche in der tabellarischen Übersicht unter der III. Hauptgruppe aufgeführt sind, waren fast durchweg vordere und hintere Scheidenwand prolabiirt oder invertirt, sehr häufig bestehend Cysto- oder Rectocele. Von diesen 125 Fällen wurde in 39 die Kolporrhaphia ant. mit der Kolporrhaphia post. verbunden, ohne dass man gleichzeitig eine grössere Dammeubildung vornahm. Die Heilung dieser 39 Operirten nahm einen normalen Verlauf; das augenblickliche Resultat war fast durchweg ein gutes, gegenwärtig sind noch 15 Frauen davon recidivfrei, 2 trotz mehrfacher Entbindungen; 3 von denen mit Rückfall haben schwere Geburten durchgemacht; bei einer von ihnen ist

jetzt Vaginalfixation mit Kolpoperineorrhaphia vorgenommen; eine, die schon früher vor dem Jahre 1887 2 Mal kolporrhaphiert worden war, ist ohne Vorfall geblieben; 2 unterzogen sich wegen bald p. op. eintretenden Recidivs einer nochmaligen Operation, eine davon ist laut brieflicher Mitteilung dauernd beschwerdefrei; die andere hat wieder Prolaps beider Vaginalwände. Von 13 habe ich keinen Befund erlangen können, da von den meisten der gegenwärtige Aufenthaltsort nicht zu ermitteln war; eine war gestorben.

Ein Mal wurde neben dieser Kolporrhaphia duplex die Taitsche Dammplastik gemacht, und zwar wurde letztere etwas modifiziert; absichtlich wurde eine typische Kolpoperineorrhaphie vermieden, weil die Anfrischungsfläche ins Bereich eines vorhandenen Decubitalgeschwürs gefallen wäre. Der momentane Erfolg war gut; gegenwärtig war nichts zu ermitteln.

In 69 Fällen, die auch zu den obigen 125 gehören, wurde die Kolporrhaphia ant. mit der Kolpoperineorrhaphie kombiniert; auch hier wurde statt der Hegarschen Methode bisweilen die Kolpoperineoplastik durch Glissement nach Doléris gemacht. Die Rekonvaleszenz derselben war im allgemeinen eine glatte, zeigte nur bisweilen geringe Temperatursteigerungen. Eine Frau starb an intercurrenter Pneumonie. Die Heilung erfolgte fast ausnahmslos per primam reunionem; nur in einem Falle war eine sekundäre Plastik nötig, weil — vielleicht infolge der Brüchigkeit der Gewebe bei der 54 jährigen Patientin — die hintere Wandfläche völlig grau belegt, bei gleichzeitig bestehendem Fieber auseinanderklaffte. Das Resultat war schliesslich ein gutes. In einem anderen Falle war bei der Entlassung eine oberflächliche Fistel vorhanden, die von der Mitte des Dammes nach hinten verlaufend in der Nähe der Analöffnung ausmündete; Pat. hat jetzt in ihrer Antwort nichts von derselben erwähnt, demgemäss mag sie wohl verklebt oder unbeachtet geblieben sein. Die Dauererfolge sind im all-

gemeinen gute; viele Frauen berichten wohl — nicht nur die nach dieser, sondern auch die nach den anderen Methoden operierten — über geringere oder stärkere Senkungsempfindungen, die sich besonders beim Heben schwerer Lasten, Treppensteigen etc. zeigen, jedoch ist der Zustand ein bei weitem besserer als vor der Operation; bei manchen ist auch wohl ein geringer descensus der einen oder der anderen Wand konstatiert, doch ist trotzdem der Endeffekt ein guter zu nennen. Es geben nun 9 Bericht über Recidiv und starke Verschlimmerung ihres durch die frühere Operation so sehr gebesserten Zustandes nach Überstehung schwerer Geburten. Ein Fall (No. 94) ist vielleicht deshalb interessant, weil bei der sonst ohne Kunsthilfe verlaufenden Geburt eine centrale Dammruptur entstand, durch die hindurch das Kind geboren wurde; der Riss wurde sofort durch complizierte Etagnennaht geschlossen. Ich will dahin gestellt sein lassen, ob diese Ruptur lediglich durch die infolge der Operation geschaffene, überaus grosse Enge des Scheideneingangs hervorgerufen wurde, oder ob vielleicht der Grund in der geringeren Widerstandsfähigkeit des Dammes, die durch die vorausgegangene Operation gerade an dieser Stelle des Durchbruchs gesetzt wurde, zu suchen ist. Gegenwärtig besteht nun wieder ein totaler Prolaps der vorderen Wand bei gleichzeitigem descensus uteri.

Die 10 Fälle, in denen Kolporrhaphia ant. und Perineoplastik nach L. Tait zusammen ausgeführt wurden, bieten hinsichtlich ihres Verlaufes und ihrer primären Heilung keine Besonderheiten; jedoch berichteten 5 in der Weise operierte Frauen über starke Vorfallsbeschwerden, während eine verstorben war, und 2 unbekannten Aufenthalts. Es ist nun freilich oft nicht leicht, zu entscheiden, ob die von den Patientinnen mitgeteilten Beschwerden — namentlich in den Fällen, wo die Mitteilungen briefliche sind — wirklich auf Rechnung eines beginnenden oder schon bestehenden Recidivs zu setzen sind, oder ob sie mit anderen Unterleibs-

affektionen im Konnex stehen. — In einem Falle (No. 136) wurde Kolporrhaphia ant. et post. und Kolpoperineorrhaphie gemacht; doch auch so konnte ein Recidiv nicht verhütet werden, indem Pat. kurz p. op. einen Abort und sodann eine — angeblich ohne irgend welche Dammverletzungen ablaufende — Geburt durchmachte; durch eine zweite Operation ist auch keine Retention des Prolapses erreicht worden, sondern neben anderen Vorfallsbeschwerden besteht wieder eine beutelartige Vorbuchtung der Vagina, so dass Pat. nur ganz leichte Arbeit thun kann.

Einmal (No. 148) wurde Kolporrh. ant., Kolpoperineorrhaphie und Perineoplastik nach Tait zugleich ausgeführt; vom 6. Tage an traten geringe Fiebererhebungen auf; am 10. Tage klaffte die Dammwunde in ihren unteren zwei Dritteln und war am Damm ein kirschgrosses Hämatom sichtbar, welches sofort incidiert und drainiert wurde, so dass es keine schlimmen Folgen weiter hatte; die Dammwunde heilte schliesslich per secundam intentionem; und gegenwärtig besteht vollständiges Recidiv bei allgemeiner Körperschwäche der Pat., die zudem nach der Operation noch eine schwere, protrahierte Zwillingsgeburt überstanden hat.

Vier mal wurde neben einer mit Kolporrh. ant. kombinierten Kolpoperineorrhaphie noch eine kleine Kolporrh. post. duplex ausgeführt, indem aus dem hinteren Laquear kleine, nach der Mitte der hinteren Wand zu convergierende ovale Lappen ausgeschnitten wurden, um so eine noch intensivere Verengung zu erzielen; alle 4 Fälle haben Recidiv grösseren oder geringeren Grades.

In den 4 ersten unter Hauptgruppe IV der tabellarischen Übersicht angeführten Fällen ist nur Amputatio colli infravaginalis mit Kolporrh. ant. vorgenommen, wovon in 2 Fällen Beschwerden ohne wesentlichen Prolaps mitgeteilt werden, während in 2 Fällen totales Recidiv eingetreten ist; im Fall No. 155 kehrte sogar das alte Leiden in verschlimmertem Masse wieder, nachdem P. noch dazu

zwei schwere Entbindungen durchgemacht hatte; an ihr ist jetzt die Freundsche Prolapsoperation vorgenommen. —

Von den beiden Frauen; an denen die Kolporrh. ant. mit Perineoplastik nach Tait und Amp. colli infravag. ausgeführt wurde, ist die eine nach der Operation schwer neurasthenisch erkrankt, während das Grundleiden gehoben ist; die andere, bei der der Damm nicht ganz p. p. und mit starker Einziehung geheilt war, ist gegenwärtig zur Ventrofixation des wieder prolabierten Uterus, der zugleich ein Myom enthält, aufgenommen.

3 Mal ist die Amp. colli infravag. mit der Kolporrh. post. vereinigt. Nur von einer der Operierten liegen Nachrichten vor; dieselbe ist seit der Operation 2 mal mit Hülfe der hiesigen Poliklinik entbunden; während der menses leidet sie an Drängen nach abwärts; der geringe Descensus der hinteren Wand wird durch Pessar zurückgehalten.

Die 15 Fälle, wo Kolporrh. ant. et. post. mit Amp. colli infravag. kombiniert wurden, haben 7 Dauererfolge aufzuweisen. Eine Pat. (Fall No. 174) war schon 1886 einmal auswärts kolporrhaphiert worden, und hat jetzt wieder totalen Prolaps der vorderen Wand, den sie durch Bandage zurückdrängen muss, um nicht den lästigsten Beschwerden ausgesetzt zu sein; auch sie hat eine schwere, mit Forceps beendigte Geburt gehabt. Beachtenswert ist auch Fall No. 167; es soll nämlich nach brieflichem Berichte der Tochter der Pat. letztere nach der Operation völlig gesund gewesen sein, bis sie eines Tages nach Heben eines schweren Korbes ganz plötzlich im Moment des Hebens ein totales Recidiv bekam, welches ihr binnen wenigen Tagen den exitus letalis brachte.

Die 21 Fälle, in denen Kolporrh. ant., Kolpoperineorhaphia und Amp. colli infravag. zusammen vorgenommen wurden, weisen 7 Recidive auf; 2 sind nach schweren Entbindungen entstanden. In einem Falle (No. 177) wurde nach Auseinanderklaffen der hinteren Wundfläche eine erfolglose Sekundärnaht vorgenommen, so das P. schliesslich

mit klaffender Wunde am introitus entlassen wurde; über ihre späteren Schicksale ist nichts bekannt.

In einem Falle (No. 178) wurde ausser der Kolpoperineorrhaphie in atypischer Weise noch seitlich und mehr nach dem Laquear zu ein quergestelltes Oval excidiert, weil man trotz grösster Anfrischung doch noch Material in Fülle hatte; trotzdem ragte bei der Entlassung die hintere Wand wieder in den introitus vor; gegenwärtig berichtet P., dass sie völlig gesund sei. — 2 weitere Fälle betrafen Recidivoperationen; und wieder kann man die Beobachtung machen, dass der Erfolg derartiger Operationen fast stets nur ein momentaner ist, denn in beiden Fällen ist die Vagina wieder prolabiert. —

Ein Mal wurde die Kolpoperineoplastik mit Keilexcision beider Muttermundslippen verbunden; hier war schon der momentane Erfolg nur ein teilweiser, weil der Damm infolge der Brüchigkeit der Gewebe bei der 62 jährigen Frau nicht völlig heilte; eine Nachricht über das jetzige Befinden ist nicht zu erlangen gewesen.

Die Amputatio colli supravag. wurde zusammen mit Kolporrhaphie und Dammplastik in 31 Fällen ausgeführt. Die Combination von Kolporrh. ant. et post. und Amp. colli suprav. bot 2 gute augenblickliche Heilungen; im 3. Falle war bei der Entlassung die vordere Wand schon wieder leicht descendiert, wenn auch gut vereinigt, der Damm per secundam geheilt, mit starker Narbenbildung; zugleich bestand eine Rectocele; doch P. war beschwerdefrei; sie unterzog sich am 29. VI. 1889 einer nochmaligen Operation, wurde mit gutem Erfolg entlassen, hat aber jetzt wieder ein vollständiges Recidiv, dass sich schon 3 Monate p. op. wieder bemerkbar gemacht haben soll. — Auch die Frau, bei der Kolporrh. ant. mit Perineoplastik n. Tait und Amp. colli supravag. gemacht ist, zeigt völliges Recidiv.

Die 25 Fälle, in denen Kolporrh. ant., Kolpoperineorrhaphie und Amp. colli supravag. ausgeführt sind, haben 10

Recidive; über 4 Frauen war nichts zu eruieren; eine war infiziert und starb am 9. Tage p. op.; 2 wurden wegen Recidivs zum 2. Male operiert, eine davon ist tot, die andere ist seitdem ziemlich geheilt. Eine andere wurde mit Perinealfistel entlassen und hat dieselbe gegenwärtig noch, und zwar sieht aus derselben eine herniöse Ausstülpung der hinteren Vaginalwand heraus.

Von den 3 Perineoplastiken nach L. Tait ist eine noch jetzt oder, besser gesagt, bis jetzt völlig geheilt; im anderen Falle besteht schon seit 9 Monaten wieder Druck nach abwärts; der 3. Fall war gleich von vorn herein ein Misserfolg. — Zuletzt will ich noch die eine nach Küstner modifizierte Dammplastik erwähnen, welche wegen desc. vag. post. an einer Frau ausgeführt wurde, bei der während schwieriger Zangenentbindung eine doppelseitige, sehr mangelhaft geheilte Episiotomie gemacht war. Es wurde die Episiotomienarbe beiderseits längsgespalten und nach Abtragung des Narbengewebes durch die Naht vereinigt und so eine enge Scheidenöffnung erzielt. Der Erfolg ist bis heute — allerdings ist seit der Operation noch kein Jahr vergangen — ein zufriedenstellender; P. ist gegenwärtig im VII.—VIII. Monat gravid.

Wie wir also aus dem Vorstehenden schon ersehen haben, war der momentane Erfolg der Operation der denkbar beste: es konnten 220 Frauen, d. i. 95,20% als völlig geheilt entlassen werden, bei 7 war ein teilweiser Erfolg zu konstatieren, in 1 Falle ein Misserfolg, in 2 Fällen war der Entlassungsbefund nicht im Krankengraphen angegeben; 2 Frauen starben in der Klinik.

Nicht so günstig sind dagegen die dauernden Erfolge. Um diese festzustellen, zog ich bei den einzelnen Operierten, so weit dies möglich war, Erkundigungen nach ihrem späteren und jetzigen Befinden ein; und von den Nachrichten, welche an mich gelangt sind, kann ich 165 verwerten; davon sind 106 briefliche Mitteilungen, teils von den Patientinnen selbst, teils von den Angehörigen, in einigen

Fällen auch vom Arzte herrührend; 59 geben den Befund wieder, wie er in der Sprechstunde der Klinik aufgenommen worden ist; gestorben sind 9; von 8 habe ich in den poliklinischen Journalen der vergangenen Jahre einige Nachrichten über ihren Zustand auffinden können; von den übrigen weiss ich nichts.

36 haben von Schwangerschaft und Geburt Mitteilung gemacht, und zwar ist davon der Operationserfolg durch die starke Dehnung der weichen Geburtswege in der Austreibungsperiode oder durch Dammrisse wieder vereitelt in 23 Fällen; es sind von diesen 23 Frauen

16 je 1 Mal,

5 „ 2 „

1 „ 3 „ entbunden,

eine hat 5 Aborte durchgemacht. 13 sind trotz Schwangerschaft und Geburt ohne Recidiv geblieben, davon sind

8 je 1 Mal,

4 „ 2 „

1 „ 3 „ entbunden.

Was nun die bleibenden Erfolge anbetrifft, so ergaben sich als gute

nach den brieflichen Mitteilungen 63, d. i. 59,40%, nach dem Befunde aus der Sprechstunde 39, d. i. 66,00%, und im Durchschnitt erhalten wir so eine andauernd gute Heilung in 61,80% der Fälle.

In 47 Fällen, d. i. 28,60%, ist ein Recidiv zu konstatieren, bei den restierenden ist ein teilweiser Erfolg vorhanden.

Das für die so zahlreichen Recidive wohl am meisten in Betracht kommende ätiologische Moment mögen einestheils die Lebensverhältnisse, in denen sich die hier zu berücksichtigenden Frauen befinden, abgeben; denn gar viele mussten bald nach der Operation wieder die schwerste Körperarbeit verrichten, so dass die junge Narbe dem Drucke der durch die Anstrengung der Bauchpresse nach unten gezogenen Unterleibsorgane nicht den gehörigen

Widerstand entgegenzusetzen vermochte, und die sich neigenden Teile gar bald einen Ausweg in die Schamspalte als *locus minoris resistentiae* fanden; bei anderen wurde der reparierte Beckenboden durch neue Schwangerschaften und Geburten wieder schlaff gemacht. Ob vielleicht auch der Umstand angeschuldigt werden könnte, dass die Operationen nur selten in zwei Sitzungen, weit häufiger aber in einer einzigen, ausgeführt wurden, vermag ich nicht zu beurteilen.

Des Vergleiches wegen will ich nun zum Schlusse noch kurz einige Berichte aus anderen Kliniken erwähnen: es sind solche aus der Berliner, Freiburger, Breslauer, Kieler, Greifswalder, Dresdener, Leydener Klinik erschienen, in denen die Resultate der in den betreffenden Anstalten ausgeübten Verfahren beleuchtet werden. Spaans teilt z. B. aus der Treubschens Klinik in Leyden die Resultate nach der Hegarschen Methode mit, demzufolge 14 Fälle ohne Amp. colli 11 Heilungen, 2 Recidive p. part. und 1 geringen Prolaps der vorderen Wand zeigten, und 13 Fälle mit Amp. portionis 9 Heilungen, 4 Recidive, davon 2 p. part., später aufwiesen. Früher schon veröffentlichte Dorff aus der Freiburger Klinik eine Zusammenstellung über 124 Fälle, in denen in 84% dauernde Heilung erzielt war; später berichtete Sonntag aus derselben Klinik über 120 Fälle, in denen sogar 92% geheilt blieben. Hegar selbst hat 150 von ihm operierte Fälle noch nach Ablauf von $3\frac{1}{2}$ Jahren kontrollieren können, in denen kein einziger Misserfolg zu konstatieren war. Aus Leopolds Klinik in Dresden wurde von Münchmeyer über 180 Operationen berichtet; von diesen wurden 139 weiter beobachtet, und nach längerer Zeit konnten noch 82,5% als definitiv geheilt gelten.

Gar sehr abweichend von diesen so vortrefflichen Ergebnissen fielen aber die Nachforschungen aus der Breslauer und Berliner Klinik aus. Nämlich aus ersterer konnte Asch von 87 Fällen nach Verlauf von mehreren

Jahren nur 59⁰/₁₀₀ als bleibend recidivfrei betrachten, während 94⁰/₁₀₀ mit gutem Resultate entlassen worden waren. Ähnlich erging es Cohn, der aus der Schröderschen Klinik von 105 Fällen nur 56,6⁰/₁₀₀ als dauernd 'gesund ansehen konnte; dieser Prozentsatz bezieht sich allerdings nur auf die klinischen Fälle, während bei den Privatkranken 86,7⁰/₁₀₀ geheilt waren.

Auch Hofmeier giebt in dem Grundriss der gynae-kologischen Operationen seine Ansicht über Prolapsoperationen kund; er spricht sich auch sehr zu Gunsten der Simon-Hegarschen Methode aus; er hat sie fast ausnahmslos geübt, und wenn er auch nicht in allen Fällen lineare Vereinigung erzielte, so war doch fast stets der plastische Effekt ein vollkommener. Freilich standen die bleibenden Erfolge gleichfalls hinter den ursprünglichen sehr zurück ebenso wie auch die von uns aufgestellte Statistik gezeigt hat. Hofmeier betont nun namentlich, dass in Fällen starker Erschlaffung der Bauchfellbefestigungen die Prognose zweifelhaft zu stellen sei, da doch alle diese plastischen Scheidenoperationen auf die Befestigungsapparate des Uterus, wie er sich ausdrückt, ja nicht direkt einwirken können. Aber sollte wirklich wieder eine geringe Senkung des Uterus oder der Vagina sich bemerkbar machen, so ist doch der restaurierte Beckenboden widerstandsfähig genug, die Retention der zum Prolaps neigenden Teile zu bewirken; er kann ja auch — und dies Hilfsmittel ist nicht zu unterschätzen — durch Pessare unterstützt werden.

Fragen wir uns nun noch, weshalb die Resultate der einzelnen Operateure so sehr verschiedene sind, so finden wir den Grund einmal in der engeren oder breiteren Indikationsstellung, sodann in der Ungleichheit der Fälle vor der Operation, weiter in der Lebensstellung der Kranken, in ihrem Lebensalter; und gerade in diesen Punkten wird ja neuerdings immer wieder gearbeitet, und während der eine Autor die alten Methoden, wenn auch mit geringen Variationen, als die einzig brauchbaren preist, werden von

anderen neue Verfahren publiziert; es werden engere Indikationen gestellt, es wird die Aetiologie immer mehr und mehr als besonders ins Gewicht fallend betont. — Die Akten betreffs der Prolapsoperationen sind noch nicht geschlossen, und noch ist nicht der Höhepunkt der Technik erreicht, denn obwohl auch die primären Erfolge dank der aseptischen Wundbehandlung und ganzen Vervollkommnung der Operationsverfahren beinahe vorzügliche zu nennen sind, lassen doch die Dauererfolge noch zu wünschen übrig; und es ist der Zukunft vorbehalten, auch auf diesem Spezialgebiete der operativen Gynaekologie soviel zu schaffen, dass der definitive Erfolg der Operation ein passendes Verhältnis annehme zu dem ursprünglichen Resultate. Solange das noch nicht erreicht ist, geben wir uns mit den Erfolgen zufrieden, welche wir haben. Wir mögen uns doch nur daran erinnern, dass diejenigen von den Operierten, welche nicht völlig geheilt werden, in der Mehrzahl wenigstens wieder soweit von ihrem Leiden zu befreien sind, dass sie ihrer Arbeit ungehindert nachgehen können, und falls sie nur einigermaßen ihrer Gesundheit leben und den Mahnungen, welche ihnen nach der Operation mit auf den Weg gegeben werden, eingedenk sind, doch ganz anders als früher, wieder getrost ihrer Familie leben können. Und für die Angehörigen der besser situierten Klassen stellt sich die Prognose noch um so günstiger, als sie mehr als die Frau des Volkes allen an sie herantretenden Schädlichkeiten auszuweichen vermögen.

Tabellarische Übersicht.

I. Kolporrhaphia anterior.

Litd. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vortalis, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat. — Entlassung	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
1.	1888 35. Sch., 51 j., III p.	Frau A.	Prolaps, vag. ant. Cystocele.	Dr. Keil.	Glatt. Ent- fernung der Nähte am 10. Tage.	24.1. 5.2.	Gutes Resultat.		† seit 2 Jahren. Nähere Angaben fehlen.	
2.	1888 72. 28 j., III p.	Frau W.R.	Prolaps, vag. ant.	Dr. Keil.	Glatt. Ent- fernung der Nähte vom 9. Tage an.	15.2. 1.3.	Gutes Resultat.	1 partus Novbr. 1892, war schwer, vorh. schon ein leichter.	20. IX. 1890 guter Erfolg. 26. V. 1893 Desc. incip.; retro- versio uteri. 17. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Trotz schwerer Arbeit Wohlbefinden. Vordere Vaginalwand etwas prolabierte, hintere weniger; uterus dextro- retroflektiert.	
3.	1889 269. 27 j., II p.	Frau B.St.	Descens. vag. ant. Retro- flexio uteri.	Prof. von Herff.	Am 10. Tage 38,0 Abend- temp.; sonst normal.	24. 5.11. 10.	Heilung per primam.	2 partus, letzter 6. I. 1892.	Wegen Recidivs am 19. I. 1893 zum 2. Male operiert (cfr. No. 20).	

II. Kolpoperineorrhaphia.

4.	1887 230. 43 j., III p.	Frau W.R.	Prol. vag. post. permanens.	Dr. Keil.	Fieberfrei. Rheumatis- mus im rech-	27.7. 25.8.	Per primam. Starke Ver- engerung des		22. XII. 1894. Untersuchung in der gynäkol. Sprechstunde. Vulva für 2 Finger offen. in	
----	----------------------------	-----------	--------------------------------	-----------	---	-------------	--	--	--	--

5.	1888 Led. S. St., 19. 51 j., II p.	Prol. vag. post.	Dr. Keil.	Glatt. Entfernung d. Nähte am 10. Tage	13.1.29.1	Gute Heilung bis auf einige am Frenulum durchgeschnittene Nähte; hier Heilung durch Granulationen	Uterus retrovertiert, normal lang, leicht descendiert. Metritis colli. — Seit 1 Jahre Klimakterium; seit derselben Zeit bei schwerem Heben Drang nach unten. Kein Vorfall.
6.	1888 Frau B. F., 25. 42 j., VII p. 2 Ab.	Dese. vag. post.: Laceratio cervicis.	Dr. Keil.	Glatt. Am Frenulum mehrere Nähte durchgeschnitten, sodass ein kleiner Defekt entsteht.	15.1.31.1.	Gute Heilung der Scheide, gute Granulationsbildung am Defekt.	18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Geringe Beschwerden beim scharfen Gehen oder schweren Heben; sonst Wohlbefinden. Kein Vorfall.
7.	1890 Frau F. M., 422. 52 j., VI p. 3 Ab.	Prol. vag. post.	Dr. Fischer.	Fieberfrei. Gerüinge Brouchitis. Am 11. Tage Entfernung d. Nähte	6.3.20.3.	Prima intentio. Starke Verengerung. Sehr gutes Resultat.	Jetziger Aufenthalt nicht zu ermitteln.
8.	1890 Frau M. H., 113. 25 j., II p.	Prol. vag. post.; Rupt. pernici in compl., Lacerat. cervic. d.	G.-R. Kaltenbach.	Glatt.	11.6.24.6.	Gutes Resultat.	22. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Bei schwerer Arbeit Schmerzen in der linken Seite und Senkungsempfindungen. Kein Vorfall.

Zugleich Emmet ausgeführt.

2 partus; der erste 1893, schwer, Dammriss. Der 2. leicht.

Lide. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name de, Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
9.	1890 150.27 j, II p.	Fr. A. Sch., 150.27 j, II p.	Prol. uteri et. vag. post.; Rupt. perin. incompl., Phos- phatsteine im Vaginalreser- voir nach par- tieller Kolpo- kleisis.	G.-R. Kal- tenbach.	Am 2. Tag p. op. 38,2 Abend- temper., sonst normal. Vom 10. Tage an die Nähte ent- fernt.	10.7.	Prim. intentio. Introitus eng. Gutes Resul- tat.		Wegen Desc. vag. ant. 1. V. 1894 Kolporrh. ant. et Kolpo- perineorrh. ausgeführt. Trotz guter Heilung ist am 7. IX. 1894 wieder ein Prol. der vord. Wand zu konstatieren. Pessar hält nicht.	Mit der ersten Kol- poperine- orrh. 1890 war Litho- tonia va- ginalis combinirt
10.	1890 190.53 j, IX p.	Fr. H. Sch., 190.53 j, IX p.	Prol. vag. post., Descensus uteri, Rupt. perin. incompl.	Dr. Fischer.	Mässig fieber- hafter Verlauf vom 31. VII.- 3. VIII. wegen Pleuritis dupl., am 10. VIII. Perinealnähte entfernt, in der Sporngegend klaubt die Wun- de etwas; ca. 2 cm oberhalb in der Scheide geringe Ne- krose.	30.7.13.8.	Scheidenwun- de mit Nekro- senbildung, Dammwunde reaktionslos geheilt.		4. XI. 1890. Sehr gutes 'Re- sultat. 1. I. 1895. Briefl. Mit- teilung. Klagen über Rücken- schmerzen und Atembeschwer- den; von seiten der Genitalien ist alles in Ordnung.	

12	1891	Frau D. R., 98. 41 j., IV p. 1 Ab.	Inversio vag. post. totalis, Ectropium et ulcus portio- nis; Elongatio colli; Retrover- sio uteri, Va- ginalcyste.	Dr. Rösger.	Am Operati- onstag 5. u. m. Nachblutung, blutdurchförmig gazetam- ponade ge- stellt wird Am 2. Tag p. o. 38,6 Abentemp., Am 3. Tag p. o. 38,2 Abent- temp.	Fieberfrei. Am 10. Tag Ent- fernung der Nähte.	16.7. 18.7.	Per primam. Gutes Resultat.	Ohne Recidiv 2 Jahre p. op. an Wassersucht gestorben.	Zugleich mit der Kolpope- rineorrh. wird die Ausschä- lung der Vaginal- cyste vor- genommen	hinter Vaginalwand bis zur Mitte, die vordere bis zum vorderen Drittel circulär pro- labiert; geringe Rectocele. Urethralwulst bläulich verfärbt. Uterus der 16. Woche der Schwangerschaft entsprechend, nicht descendiert.	Zugleich Emmet linkerseits ausgeführt
13	1891	Frau L. F. 124. 40j. IV p.	Descens. vag. post., Rupt. perin. inveter., Endometris, Retroflexio uteri.	Dr. Bräsen.	Fieberfrei. Am 10. Tag Ent- fernung der Nähte.	16.7. 18.7.	Per primam. Sehr gutes Resultat.	28. XII. 1894 Briefl. Mittheilung. Völlige Heilung.				
14	1891	Frau A. Th. 145. 26j. II p.	Fesc. vag. post., Rupt. perin. inveter. Ectropium portio- nis. Retro- flexio uteri, Cer- vicalkatarrh.	Dr. Fischer.	Fieberfrei. Am 10. Tag Ent- fernung der Nähte.	14.7. 27.7.	Per primam. Gutes Resultat					

Idde. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat. Entlassg.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
15	1892 383	Frau L. S. 36j. IV p.	Prol. vag. post., Recto- cele.	Prof. v. Herff.	Vom 6-13. II. Stomatitis; am I., 2., 4., 5. Tag p. op. 38, I Abendtemp., sonst glatt.	4.2. 21.2.	Per primam. Gutes Resultat	1 normaler partus; 1 Abort.	8. VI. 1894. Sprechstunde. Gutes Resultat. Residua post abortum.	
16	1892 398	Led. B. H. 23j. 0 p:	Desc vag. ant., Atrophia uteri	G.-R. Kalten- bach.	Fieberfrei.	16.2. 29.2.	Kolpoperei- neorrhaphie, teilweise nicht geheilt; ge- ringer Descen- sus d. vorderen Wand.		20. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva für 1 Finger klaffend; kein Vorfall. Uterus antevertirt. Hat keine Beschwer- den; fühlt sich trotz schwerer Arbeit sehr wohl.	Recidiv- operation nach Ven- trofixation vom Jahre 1889.
17	1892 39.	Frau E. H. 35j. Vp. II Ab.	Desc. vag. post., Recto- cele; Rupt. pern. inc., Retroflexio uteri	Dr. Voigt.	Glatt.	23.4. 5.5.	Per primam. Gutes Resultat		Aufenthaltsort unbekannt.	
18	1892 162.	Frau L. G. 26j. Vp. I Ab.	Desc. vag. ant. et post., Lacer- at. cervic. dext., Retro- flexio uteri.	Prof. v. Herff.	Glatt.	23.8. 3.9.	Per primam. Gutes Resultat		23. XII. 1894. I.t. briefl. Mitteilg. des Ehemanns hat P. nach der Operation fortwährend Schmer- zen gehabt, auch wieder Pessar tragen müssen; sie ist am 18. V. 1893 in der Prov.-Irrenanstalt an Al. Selbstmord verstorben.	Zugleich Emmet rechts ge- macht.

20	1893 Frau B. St., 258.30., IV p.	Desc. vag. ant. et post., Retro- flexio uteri.	Dr. Voigt.	Fieberlos. Ent- fernung der Nähte am 10. Tage.	19.1.31.1.	Per primam. Tadellose Heilung.	1 normaler partus, 2 Aborte.	7. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 1 Finger klaffend; Damm gut. Uterus retrovertiert, leicht auf- richtbar. — Hodge. Kein Vorfall.	eigentlich unnütz, da die Haupt- beschwer- den von d. Parametri- tis aus- gehen. cf. No. 3.
21	1893 Frau A. G., 299.45j., IX p. I Ab.	Inversio vag. post., Recto- cele; Lacerat. cerv. lat. utr., Ectropium permagnum, Elongatio colli, Retro- versio uteri.	Prof. v. Herff.	Glatt. Am 11. Tage Nähte entfernt.	23.2. 8.3.	Per primam. Gutes Resultat		27. XII. 1894. Brief. Mitteilung. P. kann nur ihre häusl. Arbeit thun. Seit ca. 1 Jahre wieder lästiger Druck nach unten; doch kein Hervortreten der Scheiden- wände aus der Schamspalte.	Zugleich Emmet ausgeführt
22	1893 Frau A. B., 315. 50j., I p.	Desc. vag. ant., Cystocele; Desc. uteri, Rupt. perin. incompl., Elon- gatio colli, Retroversio uteri.	Dr. Kupfer- berg.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	8.3. 20.3.	Per primam. Gutes Resultat		22. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Beim Heben schwerer Lasten Gefühl von Drang vorhanden, sonst beschwerdefrei. Kein Vor- fall.	

Lfd. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
23	1893 135	Fr. au B.R., 40j., V p.	Desc. vag. ant. et post.	Dr. Hermes	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	14.7.25.7.	Am Frenulum sind einige Nähte durch- geschnitten, sonst Heilung per primam.		21. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 1 Finger klaffend, in ihr liegt die vordere Wand etwas prolabiert, sonst gut. — Starke Vorfal- lschmerzen während d. mens. — Residua parametr. dext., En- dometritis haemorrhagica.	Recidiv- operation nach Kol- porrh. ant. et Kol- poperin. vom 5. XI. 1892.
24	1893 263, 39j., II Ab.	Fr. M. W., Vp.	Desc. vag. post., Ectro- pium por- tionis; Retro- flexio uteri; Residua para- metrit.	Dr. Bücheler.	Glatt. Am 10. Tag Entfern- g. der Nähte.	8.12. 21. 12.	Die oberste Naht a. Damm ist durch- geschnitten; sonst Heilung per primam.		24. XII. 1894. Briefl. Mittheilung. Kann nur leichte Arbeit thun. Kein Vorfall. Seit 3 Monaten gravid, hat viele Schwanger- schaftsbeschwerden, daher wohl auch das seit einigen Monaten auftretende Drängen nach ab- wärts.	
25	1894 284, 62j., VI p.	Frau F. M., VI p.	Desc. uteri se- nilis; Elonga- tio colli.	Dr. Bücheler.	Glatt. Ent- fernung der Nähte am 10. Tage.	4.1. 18.1.	Per primam.		24. XII. 1894. Briefl. Mittheilung. Die Gebärmutter ist wieder tiefer getreten und macht Be- schwerden.	
26	1894 354	Frau F. L., 50 j., VII p.	Desc. pag. post., Recto- cele, Decubitus der hinteren Vaginalwand.	Dr. Rösing	Vom 9.—14. III. übel- riechender Ausfluss, des- halb Scheiden- w.	5.3. 17.3.	Scheide p. p. geheilt; am Damm 2 Draht- suturen durch- geschnitten.		22. XII. 1894. Briefl. Mittheilg. Beschwerdefrei. Dauernde Heilg.	

27	1894	Frau W B., 359, 49 j., I p.	Inversio vag. totalis; Pro- uteri; Decu- bitus portio- nis	Prof. v. Herff.	Glatt. Am 9. Tage Ent- fernung der Nähte.	2.4. 14.4.	Per primam. Damm 7 cm lang; gutes Resultat.	29. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 2 Finger klawend; in ihr eine herniöse Ausstülpung der vorderen Vaginalwand; hintere Wand und Damm tadellos. Uterus in normaler Stellung.	Recidiv- operation nach Kol- porrh. ant. et Kolpo- perineorrh. et Excisio collisupra- vag. vom 19.V.1890.
----	------	--------------------------------	--	--------------------	--	------------	--	--	--

III. Kolporrhaphia anterior und Kolpoperineorrhaphia.

28	1887	Frau A. S., 202, 42 j., III p. I Ab.	ProL. vag. ant. et post., Lace- ratio cervicis, Elongatio colli, Retro- flexio uteri.	G.-R. Kalten- bach.	Fieberfrei. Vom 10. Tage an Entfernung der Nähte.	7.7. 27.7.	Gering. Defekt am Damm; sonst gute Heilung p. p.	30. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Bei starkem Pressen wird die vordere Vaginal- wand eben sichtbar. Uterus klein, senil atrophirt. — Seit 2 Jahren Menopause. Gesund mit Ausnahme eines Magen- leidens.	Zugleich Emmet ausge- führt.
29	1887	Frau F. M., 234, 53 j., XII p. III Ab.	ProL. uteri et vaginae totalis; ulcus portionis per- magnum.	Dr. Keil.	Reactionslos.	11.8. 3.9.	Am Damm sind einige Nähte durchge- schnitten; im übrigen p. p.	Aufenthaltssort unbekannt.	
30	1887	Frau C. B., 250, 42 j., V p.	ProL. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	4.8. 24.8.	gutes Resultat.	23. XII. 1894. Mitteilung i. d. Sprech- stunde. Bisweilen beim Gehen leichte Schmerzen. Kurz p. p. bisweilen noch Drängen, das jetzt verschwunden ist. Kein Vorfal. Lässt sich wegen der menses nicht untersuchen.	

Lfd. No.	Jahr, Journ. No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
31	1887 268.	Frau Th. L., 46 j.	Prol. vag. ant. et post	Dr. Keil.	Glatt.	16.8.10.9.	Gutes Resultat bis auf einige am Damm durchschnei- dende Nähte, woselbst gute Granulations- bildung.		20. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Bald nach der Oper. kehrt das alte Leiden, mit Schmerzen aller Art verbunden, wieder. P. kann nur leichte häusliche Arbeit verrichten.	
32	1887 269.	Frau S. L., 46 j., IV p. II Ab.	Prol. vag. ant. et post. (paene totalis); Retro- flexio uteri.	Dr. Keil.	Abnormstarke Sekretion, des- halb häufiges Abspülen mit 21 % iger Car- bolsäure. Ent- fernung der Dammnähte am 10. Tage.	8.9.30.9.	Gute Heilung bis auf einige in der Mitte durchge- schnittene Nähte, wo- selbst gute Granulationen		22. IX. 1892. Metritis; retro- flexio uteri. 14. IV. 1893. Leichte inversio vag. ant. Pessar. Mai 1894. Perimetritis; retro- flexio uteri. 23. XII. 1894. Wiederum Be- fund in der Sprechstunde: Vul- varöffnung für 2 Finger klaf- fend; Uterus hochstehend, hinten leicht fixiert, nicht mehr retroreflectiert. — Kein Drängen, kein Vorfall. Klagen über Kreuz- und Lebschmerzen (Hysterica!).	Zwei Mal schon früher die Kolpor- graphie aus- geführt.
33	1887 277.	Fr. M. Sch., 36 j., III p. I Ab.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Fieberfrei.	14.9.9.10.	Gute Heilung bis auf einige am Damm	! schwere Entbin- dung 1892.	23. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde: Valva klafft; vollkommen überdehntes Peri-	

34	1887	Frau K. K., 293, 42 j., V p.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Glockner.	Am 15. X. Ent- fernung der Nähte aus der vorder. Wand, woselbst einige durch- geschnitten sind.	26.10. 30.10.	Gute Heilung.	woselbst gute Granulations- bildung.	starke Elongatio coli intravag. retroflexio uteri. Bis zur Ent- bindung völlig gesund, seitdem auch wieder Drängen nach unten. Hat bis vor 2 Monaten Pessar getragen. Dabei kann P. alle Arbeit thun. Jan. 1895. Ausführung von Vaginofixation mit Kolpoperi- neorrhaphie.
35	1887	Frau C. E., 294, 57 j. XI p.	Prol. uteri et vaginae totalis; Ulcus an der prola- bierten hinde- ren Wand, vorn Hand- tellergrösse.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	17.10. 6.11.	Gute Heilung.	Aufenthalt nicht zu ermitteln.	In 2 Sitz- ungen operiert.
36	1887	Frau A. B.,	Desc. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	3.12. 21.12.	Gutes Resultat	Aufenthaltsort unbekannt.	

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der		Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
						Operat.	Entlassung.				
37	1888 80.	Led. M. E., 23 j. I p.	Prol. uteri et vaginae totalis.	Dr. Keil.	Glatt.	23.2.		Gute Heilung.	2 Geburt, die erste sehr schwer, aber spon- tan; die zweite leicht.	22. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Frei von allen Beschwerden. Kein Vorfall. Seit August 1894 gravida.	
38	1888	Frau D., 51 j.	Prol. vag. ant. et post.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	6.3.	27.3.	Einige Damm- nähte sind durchge- schnitten, sonst gute Heilung.		26. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Wohlbefinden. Kein Recidiv.	
39	1888	Fr. V. W., 55 j.	Desc. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	20.3.	6.4.	Gute Resultat		Aufenthaltort unbekannt.	
40	1888	Frau A. F., 58 j.	Desc. vag. ant. et post.	"	Glatt.	22.3.	7.4.	Gutes Resultat		Aufenthaltort unbekannt.	
41	1888 29.	Frau W. J., 48 j.	Prol. vag. ant. et post., Lacerat. cerv. lat. d.	"		13.4.	4.5.	Gute Heilung.		17. XII. 1894. Brief. Gar keine Beschwerden. Völlige Heilung. Kann alle Arbeit thun.	Zugleich Emmet rechts aus- geführt.

35.	41 j.	et post., Retroflexio uteri.	"			doch nur massige Verengerung.	12. VI. 1893 desc. vag. post. mässigen Grades. 17. I. 1895. Brief. Bisweilen geringe Vorfallsbeschwerden. Kein Prolaps.
43	1888 37.	Frau H.M., 36 j. Desc. vag. ant. et post.	"	26.4.10.5.	Glatte Heilung.		22. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung etwas gross; Portio zerklüftet, hart; Uterus retroponiert durch hintere Fixationen; Endometritis, Parametritis post.; hintere Wand wieder mässig prolabierte. Besonders vor und nach der Regel Senkungsempfindungen.
44	1888 56. 61 j. VII p. I Ab.	Frau K.B., Prol. uteri et vaginae total.	"	28.4.13.5.	Gute Heilung.		24. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde: Vulvaröffnung für 1 Finger durchgängig. Portio steht in Spinallebene; uterus sehr klein, leicht retrovertiert. Kein Vorfall. Sehr schöner Erfolg.
45	1888 58. 30 j. I p.	Led.F.Sch., Desc. vag. ant. et post.	"	8.5.23.5.	Per primam. Nur mässige Verengerung.		
46	1888 74. 25 j.	Frau A.St., Prol. vag. ant. et post.	"	29.5.13.6.	Gute Heilung.	2 Geburt.; beide leicht, ohne Kunst-hülfe.	19. XII. 1894. Brief. Kann nur leichte Arbeit thun. Schon 6 Wochen p. op. wieder Beschwerden, die sich nach 2 Entbindungen verschlimmerten, sodass jetzt wieder Prolaps beider Vaginalwände besteht und P. zur Retention stets eine Binde tragen muss.

Life. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
47	1888 93.	Fr. Th. G., 42 j.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	8.6.	19.6.		20. XII. 1894. Brief. Nicht frei von Beschwerden. Die Vaginal- wände haben sich wieder ge- senkt. — Pessar.	
48	1888 99.	Frau L.R., 54 j.	Prol. vag. ant. et post.	"	Glatt.	16.6.	1.7.		29. XII. 1894. Sprechstunde. Vulvaröffnung klappt für 1 $\frac{1}{2}$ Fin- ger, in ihr steht eine mässige Rectocele. Vordere Wand nicht prolabiert. Uterus stark, invol- viert, hochstehend, retrovertiert. Völlig frei von Beschwerden; kann jede Arbeit leisten.	
49	1888 114.	Frau A.K., 38 j., IV. p.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	26.6.	12.7.	1 normale Geburt am 17. II. 1891 in der Klinik.	25. IV. 1891. Desc. vag. ant. et post. — Hodge. 21. XII. 1894. Sprechstunde. Desc. vag. ant. et post., starke Vorfalbeschwer- den, Schmerzen im Unterleibe und Rücken. Zur Operation bestellt.	
50	1888 172.	Frau L. K., 30 j., VII. p.	Desc. vag. ant., Prol. vag. post.	Dr. Keil.	Glatt.	1.8.	15.8.		Leidlich guter Erfolg.	
51	1888 182.	Frau M. B., 67 j.	Prol. vag. ant. et post., Elon- gatio colli.	Dr. Fahren- bach.	Am Abend des 2. Tages p. op. 38,2; sonst normal.	9.8.	23.8.		Sehr gutes Resultat.	6. I. 1895. Sprechstunde. Seit einem Falle 1892 Recidiv. In der weit klaffenden Vulva ragt

anterioris vaginagewölbe 1 cm
 tief, vorderes verstrichen. Mut-
 termund sehr eng. Uterus
 11 -- 12 cm lang; Damm 3 cm
 hoch, Sporn anscheinend nicht
 eingehellt oder später einge-
 rissen.

52	1888	Led. E. B., 194. 26 j., I. p.	Prol. vag. ant., Desc. vag. post. Retroflexio uteri.	Dr. Keil.	Glatt.	25. 8. 8. 9.	Gutes Resultat.			
53	1888	Fr. A. Sch., 40 j.	Prol. uteri et vaginae.	Dr. Eberhardt.	Glatt.	2. 9. 28. 9.	Gutes Resultat.	1 Abort 3 Monate p. op.; vor 4 Jahren (Schief- lage, vor- zeitiger Wasserab- fluss, Foe- tus mor- tuus).	3. I. 1894. Briefl. Mitteilung. Derselbe Zustand wie vor der Operation. Ohne Erfolg ver- schiedene Male mit Ringen be- handelt.	
54	1888	Frau E. M., 40 j.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	4. 9. 21. 9.	Gutes Resultat.		27. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Nicht völlig beschwerdefrei; 2 Monate p. o. Recidiv und später dazu noch Mastdarmvorfall (?), angeblich nach schwerer körper- licher Anstrengung.	
55	1888	Fr. Th. W., 51 j.	Prol. uteri et vaginae totalis.	Dr. Keil.	Glatt.	6. 9. 21. 9.	Sehr guter Erfolg.			

Idée. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
56	1888	Fran G., 64 j.	Prol. vag. ant.	Dr. Keil.	Glatt.	11.12.24.12.	Gute Heilung.			
57	1889	Frau L. L., 36 j.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Keil.	Glatt.	7.3.	Gute Heilung bis auf einige am Damm durchge- schnittene Nähte.	3 Geburten mit ärztl. Hülfe.	17. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Beschwerdefrei. Kein Vorfall.	
58	1889	Fr. F. Th., 404.29 j., II p.	Prol. vag. ant. et post.	G.-R. Kalten- bach.	Die ersten Tage p. o. hohe Temperaturen ohne Grund; sonst glatt. Am 13. Tage Nähte entfernt.	13.3. 4.4.	Lineare Hei- lung. Ein ca. arkstück- grosses Stück des mittleren Drittels der Scheide prola- biert beutel- artig.		Wegen Recidivs der hinteren Wand am 6. VIII. 1890 zum 2. Male operiert. (cf. No. 11).	
59	1889	Frau A. L., 24 j.	Prol. vag. ant. et post., Lacerat. cervic. lat. dext.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	20.7. 1.8.	Gute Heilung.			Zugleich Emmet rechts aus- geführt.
60	1889	Frau H. E., 185.41 j., IV p.	Desc. vag. ant. et post. Cystocele; Rectocele.	Dr. Keil.	Am 2. Tage p. op. 38,3 Abendtemp.;	12.8. 24.8.	Per primam.		5. V. 1892. Leidliches Resultat; noch Drähre entfernt. 17. I. 1893. Endometritis, Urethritis, Cys-	

61	1889	Frau F.B., 49 j.	Prol. uteri et vaginae.	Dr. Eckardt.	10. Tag Ent- fernung von Dammnäthen; am 12. Ent- fernung von Scheiden- näthen.	20.8.23.9. Scheide gut, Damm nicht geheilt.	Aufenthaltort unbekannt,	
62	1890	Frau E.M., 356.26 j., IV p.	Prol. vag. ant. et post., Cystocele; Rectocoele.	Prof. v. Herff, Dr.Fischer	Am 5. Tage p. op. 39,5 Morgentemp.; Kopfschmerzen, 78 Pulse; Wunde reaktionslos.— Sublimatirri- gation. Am 14. Tage p. op. 38,2 Morgen- temp., sonst glatt.	13.1.30.1. Per primam. Erfolg vorläufig nicht sehr gut; ein vorderer und ein hinterer Zippel stehen über den introitus vor.		
63	1890	Led. L. F., 427.24 j., I p.	Prol. vag. ant. et post.	G.-R. Kaltenbach, Prof. v. Herff.	Glatt. Entfernung d.Nähte am 13. Tage.	4.3.19.3. Per primam. Recht gutes Resultat.	† Todesurache unbekannt.	Recidivoperation nach Köpperrh. ant. et Kolporrh. et Amp. collic supravag.vom 16.VII. 1889.

Lfd. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat. Entlassung	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
64	1890 27.	Frau B. F., 46 j., Op.	Prol. vag. ant. et post., Cys- tocele.	Dr. Fischer	Glatt.	9.4. 28.4.	Per primam. Gutes Resultat		Wegen Recidivs am 6. II. 1892 zum 2. Male operirt.	
65	1892 229, 27 j., XI. p.	Frau H. H., 57 j., XI. p.	Prol. vag. ant., Cystocele.	Prof. v. Herff.	Glatt.	6.12. 18.12.	Per primam. Starke Ver- engerung.		21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Ganz gesund. Kann dieschwerste Arbeit verrichten.	
66	1894 286, 45 j., IX. p.	Frau E. L., 45 j., IX. p.	Desc. vag. ant. et post., Retro- flexio uteri.	Dr. Bücheler.	Glatt.	8.1. 21.1.	Per primam.		7. I. 1895. Sprechstunde. Vulvar- öffnung für 2 Finger klawend; vordere Wand sehr mässig prolabiert; Sporn nicht geheilt, Uterus retroflektiert; portio dick. — Es werden noch Nähte entfernt. — Bisweilen bei Durch- fall Drängen nach abwärts.	
67	1889 72.	Frau J. K., 42 j.	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Keil, Dr. Fahren bach.	Glatt.	22.5. 3.6.	Per primam.	1 Entbin- dung am 17. I. 1891.	22. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva für 3 Finger klawend; vordere Wand mässig prolabiert; hintere prolabierte in einer mässigen Rectocele. Uterus hochstehend, retroflektiert, Por- tio ventral, sodass das ganze sich als ein ringförm. Prol. der unteren Partien der Vagina darstellt.	

69	1889	Frau E. L., 93. 55 j., III. p.	Desc. vag. ant. et post; Rupt. perin. int. invet.	Fahrn- bach. Dr. Keil.	Glatte Spitlungen mit Bor- säurelösung.	1.6. 14.6.	Per primam.	20. XII. 1894. Sprechstunde. Vulva gut geschlossen; introitus knapp für 2 Finger durchgängig; bei starkem Pressen wölbt sich die hintere Vaginalwand vor und wird in geringem Grade in der Vulva sichtbar, geringe Rectocele. Uterus stark involviert, hoch im Becken. Am Anus zahl- reiche Haemorrhoidalknoten.
70	1889	Fr. W. Sch. 152. 48 j., XI. p. I. Ab.	Inversio vag. totalis, Recto- cele, Elongatio colli, Rupt. perin. inc invet., Metrorrha- gien.	Dr. Keil.	In der Nähe des anus klei- ne Hämatom- bildung. Vom 11.—15. Tage allmählich Entfernung sämtlicher Nähte.	23.7. 6.8.	Per primam. Erhebliche Verengering.	19. XII. 1884. Brief. Mitteilung. Seit 9 Monaten wieder Be- schwerden; auch besteht, seit dieser Zeit der Vorfall wieder.
71	1889	Fr. A. Sch. 262. 37 j., VI. p. II. Ab.	Desc. vag. ant., Rupt., perin. inc. invet.	Prof. v. Herff.	Bis zum 5. Tage leichte Tempe- ratursteige- rung (38,2) bei normaler Wunde und gutem Allge- meinbefinden.	23. 5. 11. 10.	Per primam. Damm etwas zu niedrig.	3. I. 1895. Brief. Mitteilung. Seit der Entbindung wieder Beschwerden; auch soll der Uterus soweit herabgetreten sein, dass der Muttermund in der Schamspalte sichtbar wird. — Trotzdem verrichtet P. alle Arbeiten.

Idde. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalles, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlaufs	Tag der Operat. Entlassung	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
72	1890 46.	Frau E. M., 27 j., II. p.	Prol. vag. ant. et post., Cysto- cele; Lacerat. cerv. lat. dext.	Prof. v. Herff.	Fieberfrei. Am 10. V. Entfer- nung der äußeren Näh- te. Ödem der kleinen Labien Am 12. V. Weitere Nähte entfernt. Ödem noch ganz gering.	29. 4. 15. 5.	Per primam. Starke Verengerung.	3 schwere Geburten.	19. XII. 1894. Briefl. Mittheilung. Seit 4 Monaten ist der Vorfall wiedergekehrt. Kann nur leichte Arbeit thun. Pessar.	Zugleich Emmet aus- geführt.
73	1890 59.	Frau A. B., 39 j., VI. p. I. Ab.	Prol. vag. ant. et post., Cysto- cele; Rupt. perin. inc. invet., Lacerat. cerv. sin. lat.; Endometritis; Metritis.	Dr. Fischer	Glatt.	3. 5. 16. 5.	Gutes Resul- tat. Scheide und Damm per primam ver- teilt; Cervix- riss per secun- dam.		29. VII. 1893. Vordere Vaginal- wand prolabierte; uterus sehr hochstehend, retrovertiert. be- Gegenwärtiger Aufenthalt un- kannt.	Zugleich Emmet aus- geführt.
74	1890 77.	Frau E. E., 53 j., V. p., I. Ab.	Prol. vag. ant. et post., Recto- cele, Rupt. perin. inc. invet., Hernia inguinal. dupl.	Prof. v. Herff.	Glatt.	14. 5. 1. 6.	Per primam. (Gutes Resultat)		24. XII. 1894. Sprechstunde. Vul- varöffnung für 1 Finger durch- gängig, kein Vorfall; uterus steht normal. Klagen über Drängen nach unten. Ischias.	

76	1890	Frau M. St., 122. 47j., IV. p. I. Ab.	perin. inc. invet., Erosio portionis, Parametritis posterior.	Prof. v. Herff.	Glatt.	19.6.16.7.	Per primam. Gutes Resultat	19. XII. 1894. Briefl. Mitte lung. Seit 2 Jahr. Schmerzen in beiden Seiten u. in der Nabelgegend; Drängen nach abwärts, in der letzten Zeit schlimmer. Kein Vorfall.	Zugleich Emmet rechts aus- geführt.
77	1890	Frau M. S., 129. 28j., III. p. I. Ab.	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet., Elon- gatio colli, Lacerat. cerv. lat. dext.	G.-R. Kalten- bach.	4 Mal abend- liche Tempera- erhebungen bis 38,1; sonst glatt. Urin erst am 12. Tage spon- tan entleert.	16.6. 6.7.	Per primam. Gutes Resultat	6. II. 1894 schwere Entbindung; mit Kunst- schlimmer als vor der Operation, besonders störend beim Treppen- steigen. Fortwährend Drang nach unten und Gefühl von Schwäche in den Beinen.	
78	1890	Frau F. N., 218. 49j., VII. p. I. Ab.	ProL. uteri et vaginae, Elon- gatio colli.	Dr. Fischer	Bis z. 22. VIII. abendl. Tem- peratursteige- rungen bis 38,5 bei völlig reac- tionsloser Wunde. Am 10. Tag Dammnähte entfernt.	15.8.29.8.	Per primam. Erhebl. Ver- engung.	23. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Ganz gesund.	

Idde. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.- Entlassung	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be-
79	1890 224.	Fr. J. Sch.,	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet.	G.-R. Kalten- bach.	Am 11. u. 12. Tage Abends 38,1; sonst normal.	16.10.-28.10.	Per primam.			
80	1890 325.	Led. A. B., 25j., I. p.	Prol. vag. impr. ant., Rupt. perin. inc. invet., Elon- gatio colli, Hypertrophia portionis.	Dr. Rösger	Glatt.	17.11. 6.12.	Per primam. Vordere Wand noch zieml. schlaff.	Anf. Jan. 1895 eine leichte Geburt.	23. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Schon seit 1891 wieder Pessar nötig wegen Vorfallsbeschwerd., besonders nach körperlich. An- strengungen, jetzt Verschlim- merung.	
81	1890 358.	Frau D.K., 50j., XI. p. II. Ab.	Prol. vag. utrusque totalis.		Vom 20.—22. XII. Tempera- turerhöhung bis 39,0; an d. Dammwunde Nekrose 25. XII. Die hintere Wund- fläche klappt völlig, ist grau belegt. 5. I. Se- kund. Plastik, worauf noch be- z. 11. I. Fieber- bewegungen fort bestehen.	16.12. 23.1.	Gutes Resultat.		† am 29. III. 1894 nach dreizehn- wöchentl. Krankenlager wegen Rheumatismus u. Lungenleiden. — Vorfall angebl. nicht wieder- gekehrt.	

83	1891	Frau L. H. 19. 38j., I. p. I. Ab.	uteri; a. ut. perin. inc. invet., Lacerat. cerv. la. sin.	Dr. Rösger	leichtes Infil- trat d. Damm- wundränder; Nähte ent- fernt.	9.4. 23.4.	Per primam. Gutes Resultat	2. XI. 1892. Desc. vag. ant., Re- troflexio uteri. — Pessar. 21. VI. 1893. Desc. vag. ant., Prol. uteri. — Pessar. 23. XII. 1894. Brief. Beim Tragen schwerer Lasten Drängen nach unten; bei starkem Pressen wird die prolabierte Scheidenwand in der Vulva sichtbar. — Pessar. — Muss schwere Arbeit thun.	lappen- Trache- lorrhaphie (n. Frisch- Säuger) links aus- geführt.
84	1891	Frau M. Z., 37j.	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	17.4. 28.4.	Heilung per primam.	19. XII. 1894. Brief. Mittheilung. Gar keine Beschwerden. Völlige Heilung.	
85	1891	Led. J. W., 77. 24j., Op.	Prol. uteri et vaginae tota- lis.		Nicht ganz re- actionslos; einige Male Temperatur- steigerungen mit retentio urinae, Eiter- belag an der hinter. Wund- flächen. Oedem am Damm.	8.6. 4.7.	Damm per pri- mam geheilt; an d. hinteren Kolporrhaphie eine ca. erbsen- grosse, granu- lierende Stelle.	1. Nähere Angaben fehlen.	

Lfd. No.	Jahr.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Entlassung.	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
86	1891 108.	Fr. E. Sch., 43j.	Prol. vag. ant. et post., Fistulaperineo-vaginalis.	G.-R. Kaltenbach.	Fieberfrei. Minimaler Blutabgang.	20.6.13.7.	Heilung per primam. Gutes Resultat		28. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Beschwerdefrei mit Ausnahme von mässigem Drängen nach unten beim schweren Heben. Kein Vorfall. — Seit einiger Zeit lästige Empfindungen, durch eine noch liegende Nadel hervorgerufen.	
87	1891 127.	Frau A. L., 30j., 1 p.	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet., Lacerat. cerv. lat. sin.	G.-R. Kaltenbach.	Glatt.	6.7.18.7.	Heilung p. primam. Gutes Resultat	1 Abort. m. V., 2 normale Geburten; bei der ersten Dammriss, der genäht wird.	28. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Kann nur leichte Arbeit thun. Während der menses besonders Drängen nach unten, aber auch sonst Senkungssymptome.	Zugleich Emmet links ausgeführt.
88	1891 186.	Frau E. U., 35j., IV p.	Desc. uteri et vag. ant. et post., Erosio portio-nis; Endometritis; Metritis.	Dr. Fischer	Am 2. u. 3. Tage p. op. 38,9 Abendtemp., weiterhin fieberfrei.	16.8.1.9.	Heilung p. primam. Sehr gutes Resultat.		26. XII. 1864. Brief. Mitteilung. Klagen üb. zeitweise auftreten des Drängen nach unten. Sonst Wohlbefinden. Kein Vorfall.	
89	1891 189.	Frau R. F., 58j., VIII p.	Desc. vag. ant. et post., Rupt.	Prof. v. Herff.	Glatt.	16.8.1.9.	Heilung p. primam.		31. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Leidet an Rheumatismus. Vor-	

	perin. inc. invet.	bach.			Gutes Resultat	
91	1891 Frau L.Q., 232.37j., III p. I Ab.	Prof. v. Herff.	Glatt.	26.9.7.10.	Heilung p. primam. GutesResultat	12. X. 1892. Sehr guter Erfolg. 10. VII. 1894. Abort. inc. m. I., Retroflexio uteri. — Thomas- pessar.
92	1891 Led. A. C., 245. 20j., Op.	Dr.Briskien	Glatt.	9.10.21.10.	Heilung p. primam. GutesResultat	
93	1891 Frau H.B., 252. 35j., II p.	Dr.Fischer	Am 2. Tag p. op. 38,2 Abendtemp., Migräne- anfall; sonst glatt.	16.10.27.10.	Lineare Heilung p. p., sehr gutes Resultat.	22.I.1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 2 Finger klaffend; vordere Wand etwas prolabierte; Uterus retro- flectiert infolge Narbenzuges. — Zeitweise Beschwerden.
94	1891 Frau M.B., 275. 43j., III p.	Dr.Fischer	Glatt.	30.10.15.11.	Heilung p. primam.; sehr enger introitus.	22. XII. 1894. Sprechstunde. Vulvaröffnung für 4 Finger klaffend; völliger Prolaps der vorderen Wand. Uterus des- cendiert, dextroretrovertiert in- folge eines kleinapfelgrossen, runden, glatteystischen, links- seitigen Ovarialtumors. — Ver- such mit Achterpessar.

22. XII. 92
spontane
Geburt, da-
bei cen-
trale
Dammrup-
tur, durch
die hin-
durch das
Kind ge-
boren
wird. Com-
plicierte
Etagen-
naht.

Idde. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalles, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
95	1892 349, 41j., VII p.	Fr. C. Sch., 41j., VII p.	Prol. vag. ant. et post., Desc. uteri, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Briskien	Glatt.	8.1. 2.4.1	Heilung p. primam. Gutes Resultat		23. XII. 1894. Brief des Arztes. Wegen Kreuzschmerzen kann P. keine schwere Arbeit thun. Vorfall ist geheilt; jedoch beim Heben schwerer Lasten, oder wenn P. sich streckt, Gefühl von Drang nach unten.	
96	1892 386, 48j., Op.	Fran B. F., 48j., Op.	Prol. vag. ant. et post.	Dr. Briskien	Glatt.	6.2. 21.2.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		24. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Heilung. Bisweilen Kreuz- schmerzen.	Recidiv- operation nach Kol- porrh. ant. et post. vom 9. IV. 1890. cf. No. 64).
97	1892 389, 45j., VI p.	Frau E. H., 45j., VI p.	Prol. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Briskien	Am 2. Tage p. op. 38,1 Abendtemp., sonst normal. Am 10. Tage Nähte entfernt.	9.2. 23.2.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		5. IV. 1892. Tadellose Heilung. 2. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Vorfall geheilt. — Kann nur leichte Arbeit verrichten.	
98	1892 429, 23j., I p.	Led. L. B., 23j., I p.	Inversio vag. ant. et post., Erosio portio- nis; Residua	Dr. Briskien	Am 11. Tage Nähte entfernt.	14.3. 28.3.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		19. I. 1895. P. weigert sich, per- sönlich in der Klinik sich vor- zustellen. Nach Angabe der Mutter kann sie nicht arbeiten; der Vorfall soll nicht wieder genommen sein.	

100	1892	Frau M.R., 447, 52j., V p.	Prol. uteri incompl., Retroflexio uteri.	Dr. Briskien	Glatt. Am 12. Tage Entfernung d. Nähte.	17.3. 1.4.	Heilung p. primam. Gutes Resultat	30. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Gar keine Beschwerden. Vollkommene Heilung und Arbeitsfähigkeit.	
101	1892	Frau F.G., 58. 48j., XII p. I Ab.	Desc. vag. ant. et post.	Prof. v. Herff.	Gestört durch Pneumonie im linken Unterlappen. Wunde reactionslos; am 11. Tage Entfernung der Nähte.	10.5. 28.5.	Am 28. V. in die innere Klinik transferiert, woselbst am 31. V. d. exitus erfolgt. Diagnose p. mortem: Gangraenoidische Pneumonie des linken Unterlappens.		
102	1892	Fr. Th. P., 68. 38j., IV p.	Desc. uteri et vaginae. Rupt. perin. inc. invet., Lacerat. cerv. lat. sin.	Dr. Voigt.	Glatt. Am 10. Tage Entfernung d. Nähte.	21.5. 8.6.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		Zugleich Emmet links ausgeführt.
103	1892	Fr. E.Sch., 89. 35j., V p.	Prol. vag. ant. et post., Desc. uteri; Lacerat. cerv. lat. utr.	Dr. Voigt.	20. VI. Hämatoma lab. maj. sin., nach innen Perforation.	12.6. 30.6.	Gute Granulationen der Nahtlinie. Endeffekt ist ein guter.	16. VIII. 1892. Wegen zur grosse Enge der Scheide im oberen Drittel sind die Nähte nicht	

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der (Geburten)	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat. Entlassg.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen.
					ration, daher Spaltung, mit Drainage mit Jodoformgaze 25. VI. Häma- tom schrumpft ohne Eiterung.				zu entfernen; das Resultat ist gut. 28. X. 1892. Nähte mit Schwierig- keit entfernt. 21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit der Geburt hat sich der Vorfall wieder eingestellt; arge Beschwerden. — Pessar.	
104	1892 92. 44j., V p.	Frau S. D.,	Prol. vag. ant. et post., Retro- flexio uteri.	Prof. v. Herff.	Am 1. u. 2. Tage p. op. 38,1 Abendtemp., sonst normal. Am 10. Tage Entfernung d. Nähte. Glatt.	14. 6. 30. 6.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		26. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kann nur leichte Arbeit thun. Seit 8 Wochen starke Vorfall- beschwerden. Kinderfaustgross. Prolaps der Scheide. — Pessar.	
105	1892 95. 53j., II p.	Frau C. H.,	Prol. uteri et vaginae, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Voigt.	Glatt.	17. 6. 1. 7.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		13. VIII. 1892. Nähte entfernt. Sporn nicht ganz geheilt, Schluss aber gut. 23. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Bei schwerer Anstrengung Drängen nach abwärts; sonst Wohlbefinden. Kein Vorfall.	
106	1892 104. 56j., VII p.	Frau S. H.,	Prol. vag. ant. Cystocele, Desc. uteri, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Voigt.	Glatt.	27. 6. 9. 7.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		29. VIII. 1892. Nähte entfernt, gutes Resultat. 21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Wohlbefinden. Völlige Heilung.	

108	1892	Frau M.B., 136. 53j., VIII p.	lis. Prol. vag. ant. et post.	Dr. Voigt.	Am 6. Tage p. op. 38,4 Abendtemp., sonst fiebertfrei.	5.11.20.11.	Resultat leid- lich, ober- flächliche Fistel von der Mitte des Dammes nach hinten verlaufend, kurz vor der Analöffnung ausmündend.	Der äussere Winkel ist nicht p. p. ge- heilt. Resultat ist gut.	24. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Völlig frei von Beschwerden. Kein Recidiv.	Kein Recidiv.
109	1892	Led. R. W., 201. 34j., I p.	Prol. uteri et vaginae; Rupt. perin. paene compl.		Am 9. Tage Entfernung d. Dammuturen	5.11.20.11.	Gute Heilung bis auf ober- flächliche Nek- rose im oberen Winkel.	24. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Nicht völlig beschwerdefrei. Seit 3 Monaten ist wieder ein geringer Descensus zu bemer- ken.	30 VI 1894. Sprechstunde. Guter Operationserfolg. Lumbago; Mastdarmpvfall I. Grades.	
110	1892	Frau L. B., 203. 49j., V p. I Ab.	Prol. uteri et vaginae.	Prof. v. Herff.	Glatt.	5.11.20.11.	Gute Heilung bis auf ober- flächliche Nek- rose im oberen Winkel.	24. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Nicht völlig beschwerdefrei. Seit 3 Monaten ist wieder ein geringer Descensus zu bemer- ken.	30 VI 1894. Sprechstunde. Guter Operationserfolg. Lumbago; Mastdarmpvfall I. Grades.	
111	1892	Frau B. R., 205. 40j., V p.	Prol. vag. ant. et post., Desc. uteri.	Dr. Voigt.	Glatt.	5.11.20.11.	Heilung p. primam.	24. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Völlig frei von Beschwerden. Kein Recidiv.	Wegen Recidivs am 14. VII. 1893 zum 2. Male operiert.	

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Operation	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
112	1893 257. 42j., I. Ab.	Frau A.R.	Inversio vag. ant. et post., Cystocele, Rectocele, Desc. uteri; Lacerat. cerv. lat. utr., Erosio et Hypertrophia port.	G.-R. Kaltenbach.	Glatt. Am 10. Tage Entfernung der Dammnähte; in der Mitte des Dammes haben einige eingeschnitten	21.1. 5.2.	Gute Heilung p.p. bis auf eine kleine klaffende, aber auch gut granulierende Stelle in der Mitte des Dammes.		21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit 6 Monaten bisweilen wieder Drängen nach unten; sonst Wohlbefinden. Kein Vorfall	Zugleich Emmet ausgeführt
113	1893 261. 22j., I p.	Led. E. G.	Prol. vag. ant. et post., Desc. uteri, Lacerat. cervic. dupl.	Prof. v. Herff,	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	20.1. 3.2.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		27. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kann alle Arbeit thun. Kein Vorfall. Ein Pessar genügt, um P. völlig beschwerdefrei zu erhalten.	Zugleich Emmet ausgeführt.
114	1893 286. 43j., I p.	Fr. A. Sch.	Inversio vag. ant. et post., Cystocele; Descens. uteri, Retroversio uteri, Lacerat. cerv. lat. sin.	Dr. Kupperberg.	Glatt. Am 11. Tage Nähte entfernt.	10.2. 23.2.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		30. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 2 Finger klaffend; in ihr bei starkem Pressen etwas von der vorderen Wand sichtbar. Uterus steht tief, stark retroflectiert infolge Zuges durch eine seitliche Scheidennarbe. Cervix gut erhalten, Damm trichterförmig eingezogen. — Sehr wenig Beschwerden; kein Drängen.	Zugleich Emmet ausgeführt.

um keine beschwerden. völlige
Heilung.

p. primam
GutesResultat

Nähte ent-
fernt.

Cystocele;
Rectocele;
Desc. et retro-
versio uteri,
Erosio portio-
nis.

116|1893|Frau E. S.,
305.47j., III p.

Inversio vag.
ant. et post.,
Cystocele;
Rectocele;
Retroversio
uteri; Elon-
gatio colli
supravag.

Dr.
Kupfer-
berg.

Glatt.
Am 10. Tage
Nähte ent-
fernt.

3.3. 15.3.

Heilung
p. primam.
GutesResultat

117|1893|Frau W. U.,
310.38j., VII p.

Inv. vag. ant. et
post.,
Cystocele;
Rectocele;
Desc. et retro-
versio uteri;
Elongatio
colli.

Glatt.

5.3. 18.3.

Heilung
per primam.
GutesResultat

19.I.1895. Untersuchung in der
Sprechstunde, Vulva klappt für
3 Finger; in ihr liegt fast die
ganze hintere Vaginalwand
prolabiert. Hint. u. scitl. Scheiden-
gewölbe 2 cm tief. Mässig starke
Rectocele. Vordere Wand nicht
besonders prolabiert. Beim Pres-
sen kommt die Portio aus der
Vulva heraus; Uterus sonst nor-
mal. — Recidiv seit August 1894
nach schwerer Entarbeit. —
Probeweise Pessar. — Operation
vorgeschlagen.

Lfd. No.	Jahr Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
118	1893 311.	Frau A.M., 24j., II p.	Inv. vag. ant. et post., Cysto- cele; Rectocele; Desc. et retro- versio uteri; Lacerat. cerv. dupl.	Prof. v. Herff.	Am 16. III. Angina folli- cularis, 38,3 Temp., am 17. III. 38,2; sonst normal.	6.3.	19.3. Heilung p. primam. Gutes Resultat		14. VII. 1893. Guter Erfolg. 27. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kein Recidiv. Gravida mens VI., seit Beginn der Schwangerschaft Druck nach unten.	
119	1893 316.	Frau L.M., 39j., II p.	Inv. vag. ant., Cystocele; Desc. uteri; Elong. colli supravag., Lacerat. cerv. lat. sin.	"	Glatt.	9.3.	21.3. Heilung p. primam,		Aufenthaltort unbekannt.	Zugleich Trache- lorrh. sin. aus- geführt.
120	1893 329-38j., VI p.	Frau C.R., 38j., VI p.	Desc. uteri et vaginae; Retroversio uteri; Lacerat. cerv. dupl.	Dr. Kupfer- berg.	Glatt. Am 10. Tage Nähte ent- fernt.	16.3.	29.3. Heilung p. primam.		29. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für 1 Finger klaffend. Damum gut erhalten. Infolge kleiner Rectocele wölbt sich in die Scheide die hintere Wand etwas vor. Kein Vorfall. Ut. normal.— Parametritis post., Hypersekre- tion, Catarrh ventriculi.	

122	1893	Fr. E. Sch., 20. 47j., X p.	retroversio uteri, Cystocele; Rectocele; Elong. colli supravag., Lacerat. cerv. dupl., Uleus decubit. vaginae. Desc. uteri et vaginae; Cystocele; Rectocele; Retroversio uteri; Elong. colli.	"	Glatt.	11.4.23.4.	Heilung p. primam.	3 Finger klaffend; vordere Scheidenwand leicht vor- gedrängt; hinteres Scheideenge- wölbe gut hoch. Uterus leicht retrovertiert; portio steht tief, in der Führungslinie. — Bei Anstrengungen Schmerzen in der Lebergegend.
123	1893	Led. O. R., 51. 38 j., I p.	Desc. uteri et vaginae; Cys- tocele; Recto- cele.	"	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	2.5. 17.5.	Heilung p. primam.	18. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva f. 1 Finger klaffend; in sie legt sich die Spitze einer kleinen Rectocele. Uterus steht hoch, ist stark in Involution begriffen; vordere Scheidenwand sehr straff. — Seit 2 Jahren Menopause. — Drängen, Lendenmarksymptome bei schwerer Arbeit. — Hat probeweise Pessar getragen.
124	1893	Frau H. H., 54. 48 j., IX p.	Inv. vag. ant. et post., Cys- tocele; Desc. et retroversio uteri; Endo- metritis hä- morrhagica.	"	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	5.5. 17.5.	Heilung p. primam.	12. XI. 1893. Hintere Vaginal- wand ganz gering prolabierte. 27. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Vollkommenes Wohlbefinden. 21. VIII. 1893. Nähte entfernt. Vulvaröffnung etwas gross; sonst gutes Resultat. 3. I. 1895. Sprech- stunde. Vulvaröffnung für 3 Fin- ger klaffend; vordere Wand etwas descendierte; Uterus stark insolvierte, retrovertiert. — Mo- limina climacterii. — Hat schwe- re Arbeit.

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
125	1893 100, 48j., IV p.	Frau C. F.	Desc. vag. ant. et post., Cys- tocele; Desc. et retroversio uteri, Elon- gatio colli su- pravag.; Hy- pertrophia portionis.	Dr. Kupfer- berg.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	16.6.28.6.	Heilung p. primam.		25. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Volle Arbeitsfähigkeit. Seit 3 Monaten wieder Drängen nach unten, angeblich infolge hart- näckigen Hustens; jedoch kein Tiefertreten von Vagina oder Uterus zu bemerken.	
126	1893 114, 46j., VI p. V. Ab.	Frau Th. K.	Desc. vag. ant. et post., Desc. et retroversio uteri, Elong- atio colli supra- vag., Hyper- trophia portio- nis.	G.-R. Kalten- bach.	Am 8. VII. Dammnähte entfernt; klei- ner Abszess im lab. maj. dext.; sonst glatt.	29.6.14.7.	Gute Heilung p. p. bis auf einzelne Stel- len an Damm. Resultat ist gut.		28. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Kann nur leichte Arbeit leisten. Vorfall ist geheilt.	
127	1893 141, 35j., II p.	Frau M. M.	Desc. vag. ant., Retroversio uteri; Metritis; Parametritis post. residua.	Dr. Hermes.	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	18.7.30.7.	Heilung p. p., nur im unteren Wundwinkel eine erbsen- grosse, granu- lierende Stelle.		12. I. 1895. Untersuchung in 'er Sprechstunde. Vulvaröffnung für 1 Finger klaffend; beim Pressen wird d. Urethralwulst sichtbar; Uterus durch Parametritis post. retrofixiert; Damm gut. — Kein Drängen, kein Vorfall.	

143, 30 j., IV p. I. Ab.	et post., Cystocele; Retroversio uteri.	Hermes.	10. Tag Nähte entfernt.		p. p. bis auf einige am Darm durchgeschnittene Nähte.	am 8. VII. eingeeheilten Drahtnaht am Darm nach Spaltung. 17. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Beschrwerden. Kein Vorfal.
129 1893 Frau A. R., 169 33 j., V p. I. Ab.	Desc. vag. ant. et post., Rectocele; Retroflexio uteri.	Prof. v. Herff.	Glatt.	29. 8. 9. 9.	Heilung p. primam.	
130 1893 Frau L. R., 187 54 j., III p. IV. Ab.	Desc. vag. post., Rectocele.	Dr. Hermes.	Glatt. Am 8. Tage Nähte entfernt.	9. 9. 20. 9.	Gute Heilung p. p. bis auf einige am Darm durchgeschnittene Nähte.	7. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulvaröffnung für $1\frac{1}{2}$ Finger klaffend, in sie wölbt sich eine geringfügige Rectocele. Vordere Wand nicht prolabierte; Portio in der Spinal-ebene; Uterus stark involviert. — Bei schwerem Tragen Drang nach unten und Schmerzen in beiden Seiten.
131 1893 Frau M. W., 218 39 j., VI p. I. Ab.	Desc. vag. ant., Retroflexio uteri, Rupt. perin. inc. in vet., Endometritis.	Dr. Hermes.	Glatt. Am 10. Tage Entfernung der Nähte.	27. 10. 8. 11.	Heilung p. primam.	20. IV. 1894. Gutes Resultat. — Metritis. 2. I. 1895. Sprechstunde. Vulvaröffnung für 2 Finger klaffend; Urethralwulst etwas prolabierte. Uterus steht hoch. Kein Vorfal. — Allgemeine Neurasthenia gravis.
132 1894 Frau E. S., 316 40 j., IV p.	Prol. uteri et vag. totalis; Cystocele Retroflexio uteri Erosio et Ectrop. portiois; Uterus decub. vagin.	Prof. v. Herff.	Glatt. Am 13. Tag Nähte entfernt.	26. 1. 11. 2.	Heilung p. prim Tiefe Einziehung d. oberen, bürzelartiges Vorspringen der unteren Darinhälfte.	26. XII. 1893. Briefl. Mitteilung. Völlig frei von Beschrwerden. Kein Vorfal. — Kann alle Arbeit thun.

Leide. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Entlassung, Operat.	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
133	1894 316, 28 j., II p. I Ab.	Frau J. Th.	Desc. uteri et vaginae; Cystocele, Rectocele.	Dr. Bücheler.	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	3.2. 15.2.	Heilung p. primam.			
134	1894 360, 37 j., VII p.	Frau H. H.	Prol. uteri et vag. ant., Retroflexio uteri.	Dr. Bücheler.	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	10.3. 21.3.	Gute Heilung p. p. bis auf einige am Damm durchgeschnittene Nähte.		18. IV. 1894. Entfernung von Drähten. — Sporn nicht geheilt; desc. vag. ant. incip. 18. I. 1895. Sprechstunde. Vorderer Wand descendiert; Uterus leicht dextroretrofectirt, auf fallend gross. — Hodge. — Wohlbefinden. Arbeitsfähigkeit.	
135	1894 367, 58 j., IV p. I p.	Fr. E. Sch.	Desc. vag. ant. et post.	Dr. Bücheler und Dr. Sondheimer.	Am 2. Tage p. op. 38,4 Abendtemp. infolge Bronchitis; sonst glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	12.3. 23.3.	Gute Heilung p. p. bis auf kleine nekrotische Stelle in der Mitte des Dammes.		22. XII. 1894. Sprechstunde. Vulva für 1 Finger offen; kein Vorfall; Uterus stark involviert, antevvertiert., mässiger Fluor.	
136	1889 247, 42 j., VII p. II Ab.	Frau A. St.	Desc. vag. ant. et post., Cystocele, Rectocele, Bartholinitis sin.	Dr. Fabrenbach.	Am 6. Tage p. op. 38,0 Abendtemp. sonst normal. Am 10. Tage	11.10. 25.10.	Heilung p. primam. Sehr gutes Resultat.	1890 Abort 1891 im Juli eine normale Geburt.	Wegen Recidivs am 9. X. 1893 zum 2. Male operiert. (cf. No. 196).	

Nr.	F.	W.	I p.	III p.	desc. vag. post. Lacerat. cervic. Prol. vag. ant. Desc. vag. ant.	Kaltenbach. Dr. Keil. Dr. Fahrenbach.	In d. ersten Tg. p. op. leichte abendl. Temperatursteig. bis 38,3 b. gutem Allgemeinbefinden. Am 5. Tag einmal Erbrechen. Am 11. T. Entfernung der Dammnähte.	17.7.	p. p.	am 16. XI. 1892.	Emmet ausgeführt
138	1888	Fr. W. W., 128, 50 j., I p., 1889	Fran F. H., 199, 47 j., III p.							20. XII. 1894. Sprechstunde. Vulva für 2 Finger offen; kein Vorfall. Damm in der Mitte leicht eingezogen; uterus stark senil involviert. — Völlig frei von Beschwerden.	Am 24. VIII. 1886 schon einmal erfolglos operiert.
140	1889	Frau S. D., 204, 53 j., VIII p.			Desc. vag. ant., Cystocele; Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Fahrenbach.	Glatt. Am 12. Tage Nähte entfernt.	23.8. 8.9.	Heilung per primam.	19. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kann nur leichte Arbeit thun; Klagen über Schwindelanfälle, Drängen nach unten, auch sei wieder eine Senkung der Scheidenwand eingetreten. — Nervosa (?).	
141	1889	Fr. R. Sch., 222, 49 j., II p.			Inv. vag. ant., Cystocele; Rupt. perin. inc. invet., Uterus portio. Desc. vag. ant., Rupt. perin. inc. invet., Catr. magna cerv. sin. post magnam laceration., Stenosis orific. ext.	Dr. Fahrenbach.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	7.9. 22.9.	Gute Heilung p. p.	26. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Keine Beschwerden. Kein Vorfall.	
142	1889	Frau E. L., 319, 42 j., I p.				Dr. Fahrenbach.	Glatt.	4.12. 17.12.	Heilung p. primam. Vorzügliches Resultat.	27. XI. 1884. Sprechstunde. Vulvaröffnung etwas gross; Descensus der vorderen und hinteren Wand sehr mässigen Grades. Retroflexio uteri. Typhilitis stercoralis (?).	Zugleich Stomatoplastik ausgeführt

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalles, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Operat. Tag der Entlassg.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen.
143	1890 118.	Led. B. S., 20 j., 0 p.	Prol. vag. ant., Desc. uteri.		Glatt. Am 10. Tage Damm- wunde entfert.	16.6. 28.6.	Gute Heilung p. p.		8. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Nicht beschwerdefrei. Mitunter Drängen nach abwärts; seit ca 1 ^{1/2} Jahren ist wieder eine Senkung zu bemerken. Seit September 1894 Pessar.	
144	1890 198.	Fran A. K., 60 j., IX p. I Ab.	Prol. vag. ant., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Fischer	Glatt.	2.8. 13.8.	Heilung p. primam.		15. IX. 1893. Desc. vag. ant.	
145	1893 215.	Fr. E. Sch., 28 j., II p.	Desc. vag. ant. et post., Rupt. perin. inc. invet.	Prof. v. Herff.	Glatt.	24.10. 4.11.	Heilung p. primam.		26. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Nicht völlig beschwerdefrei. Seit 8 Monaten wieder Vorfal- symptome, besonders Drang nach unten. — Pessar.	
146	1893 226.	Frau C. S., 25 j., II p.	Desc. vag. ant., Caru k. orif. urethrae.	Dr. Bücheler.	Glatt; einige Tage Stechen in der linken Seite und systolisches Geräusch an Herzspitze.	2.11. 15.11.	Heilung p. primam.		30. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit ca. 4 Wochen bei schwerem Heben Gefühl von Druck nach unten und Herabtreten der Scheidenwand.	
147	1892 81.	Frau F. K., 47 j., III p.	Desc. vag. ant. et post., Utrus decubit.	Prof. v. Herff	Am 4. T. wegen übertriebenen Ansfusses Spül- mit Aq. Chlori.	1.6. 16.6.	Gute Heilung p. primam.		Aufenthalt unbekannt.	

149	1893	Frau A. E., 117. 39j., V p. II Ab.	Inv. vaginae totalis; Rectocele; Elongatio colli	Dr. Keil.	Glatt. Vom 13. Tage an Ent- fernung der Nähte.	29.6. 17.7.	Heilung p. p. Gutes Resultat	schwere, lang- dauernde Zwilling- geburt.	31. XII. 1894. Brief Klagen über allgemeine Körper- schwäche. Völliges Recidiv seit der Entbindung; seither mit verschied. Pessaren behandelt.
150	1893	Frau M. O., 319. 53j. XVIIp. I Ab.	Prol. uteri et vag. totalis, Cystocele; Rectocele; Retroversio uteri; Elongat. colli; Erosio portio- nis.		Am 7. Tage p. op. 38,0 Abendtemp., sonst fieberfrei Sehr stark eitriges Sekre- tion. Am 10. Tage Dammnähte entfernt.	10.3. 1.4.	Heilung p. p.	26. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Nicht völlig frei von Be- schwerden; kann nur leichte Arbeit thun. Bald p. op. wieder Drängen u. Herabtreten eines apfelgrossen Prolapses. Klagen über Intertrigo.	9. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vollständ. Reci- div. Bald nach der Operation wieder Drängen nach unten in- folge schwerer Arbeit. — Ope- ration vorgeschlagen. Recidiv- operation nach Kolporrh. Ant. et post. et Amp. colli vom 20. XI. 88. Zugleich vaginale Totalex- stirpation des Uterus mit aus- geführt.

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, (Com- plicationen)	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merken
151	1893 12. 52j., III p.	Frau R. B., 12. 52j., III p.	Desc. vag. ant. et post., Cystocele; Rectocele; Desc. et retro- versio uteri, Elongatio colli. Ulcus decubit. vag.	Prof. v. Herff, Dr. Pharma- kopoulos.	Fieberfrei. Am 10. Tage Entfernung der Nähte.	8. 4. 23. 4.	Heilung p. p. bis auf eine kleine, granu- lierende Stelle am Damm.		27. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Klagen über Magen- u. Urin- beschwerden. Descensus mäs- sigen Grades.	
152	1893 167. 43j., IV p.	Fr. Th. B., 167. 43j., IV p.	Inv. vag. ant. et post., Desc. uteri retro- flexi.	Prof. v. Herff.	Glatt.	25. 8. 7. 9.	Heilung p. primam.		14. X. 1893. Sporn nicht geheilt; Recidiv geringen Grades. 23. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Völlige Arbeitsunfähigkeit; starke Vorrallsbeschwerden, be- sonders nach der Menstruation. Ein eigentlicher Prolaps soll nicht bestehen.	

IV. Kolporrhaphia anterior, posterior mit Dammplastik und Amputatio colli infravag.

153	1888 79.	Frau L. L., 40j.	Desc. vag. ant., Elongatio colli	Dr. Keil.	Glatt.	1. 6. 12. 6.	Gute Heilung p. p.		17. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Desc. vag. post., geringfügige Rectocele; starke	
-----	-------------	---------------------	-------------------------------------	-----------	--------	--------------	-----------------------	--	---	--

1541888	Fr. A. Th., 76. 66j.	ProL. uteri et vag. totalis; Ulcus portio- nis.	"	Glatt.	30.5.11.6.	Gute Heilung p. p.	Vorfallsbeschwerden mit Pessar behandelt. Gegenwärtig be- schwerdefrei.
1551899	Fran B.N., 382. 32j., II p.	ProL. uteri totalis; ulcera decubit. vag. utrinusque.	"	Vom 2. Abend p. op. bis zum 14. Tage leichte Tempe- ratur- steigerungen bis 38,8; Nähte, fast alle durch- geschnitten, werden am 8. Tage entfernt. — Sitzbäder, Spülungen mit Kali hyp.	26.2.20.3.	Wunde mit guten Granu- lationen be- deckt, nahezu völlig geschlossen.	1890 und 1891 je eine schwere Entbindg., jedoch ohne Dammver- letzungen.
1561893	Frau L. B., 307. 60j., IV p.	Inv. vag. ant., Cystocele, Desc. uteri, Elong. coli supravag., Erosio portio- nis.	Dr. Kupfer- berg.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	28.2.12.3.	Gute Heilung p. p.	5.V.1893. Desc. vag. mässigen Grades. 27.XII.1894. Brief. Mitteilung des Arztes. Einige Monate p. op. ist wieder eine geringe Senkung eingetreten, die jedoch keine Beschwerden macht. Pessar nicht notwendig.

Lfd. No.	Jahr, Tourn.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag, der Operat. ist Entlassig	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen.
157	1889 332.	Led. A. St., 45j., I p.	Prol. vag. ant. et post., Hypertrophia portionis, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Fahren- bach, Dr. Rösger	Am 2. Tage 38,2 Abend- temperatur, sonst fieber- frei.	17.9.2.10.	Per primam. Sehr gutes Resultat.		19. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Das Grundleiden ist geheilt; jedoch seit der Operation fort- währende Klagen über Kopf-, Rückenschmerzen, Druck auf Mastdarm u. Blase, sodass P. sehr elend u. oft bettlägerig ist.	
158	1890 200.	Frau B. St., 48j., II p.	Prol. vag. ant., Rupt. perin. inc. invet. Hypertrophia cervicis, Elongat. colli, Myomata uteri.	Prof. v. Herff.	Fieberfrei. Rheumatoide Schmerzen im linken Bein. 16. VIII. Star- kes Ödem an Damm und kleinen Labien; am Damm zu- gleich mässig. Auseinander- weichen. Ent- fernung von Nähten.	4.8. 26.8.	Reactionslose Heilung der Scheide; Damm nicht ganz per primam, mit starker Einziehung. Sonst gutes Resultat.		26. XII. 1894. Untersuchung in d. Sprechstunde. Vulva t. 3 Finger klaffend, in ihr die vordere Vaginalwand sichtbar; Portio in der Nähe d. Beckenausgangs; Uterus retrovertiert, verdickt. Beim Pressen tritt die vordere Scheidenwand zur Vulva heraus Damm völlig erschlaft, in der Mitte stark eingezogen. — Pes- sarien halten nicht. — P. wird aufgenommen zur ventrofixatio uteri (myomatosis).	
159	1887 354.	Led. E. F., 28j., 0 p.	Prol. uteri et vaginae, Hy- pertrophia	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	29.11.12.12.	Gute Heilung p. p.	2 Geburt, die letzte 12. VI. 93	28. XII. 1894. Untersuchung in d. Sprechstunde. Damm sehr schlaff u. dünn; bei starkem Pressen	

160	1888	Led. A. Sch. 42. 19j., I p.	Prol. uteri et vaginae totalis	Glatt.	23.5.	Heilung p. primam.	kurz. Taubheitsgrösse Bartho- linitis. -- Beschwerden nur während der menses. -- Pessar. Hat 4 Woch. p. op. schon wieder Pessar nötig. 21.IX.1890. Gravida mens. IV. Weitere Nachrichten fehlen.
161	1889	Frau S. H., 357. 50j., II p.	Prol. uteri et vag. post., Ulcus portio- nis.	Fieberlos.	16.2.	Heilung p. primam.	
162	1887	Frau M. S., 159. 39j., IV p. I Ab.	Prol. vag. ant., Lacerat. cerv.	"	26.5. 11.6.	Leidl. Heilung, nicht völlig prima intentio	18.XII.1894. Briefl. Mittheilung. Nicht frei von Beschwerden, öfters Drang nach abwärts, doch kein Vorfall. Trägt Binde.
163	1887	Frau C. G., 181. 37j., IV p.	Prol. uteri et vaginae.	Glatt.	18.6. 9.7.	Per primam. Gutes Resultat	18.XII. 1894. Briefl. Mittheilung des Arztes. Geringer Descensus durch Zufühlen mit d. Finger zu konstatieren. Bei schwerer Arbeit Beschwerden mässigen Grades, sonst keine, Hat starke körperliche Anstrengungen.
164	1887	Frau H. K., 290. 36j., III p.	Prol. uteri et vaginae.	Glatt.	5.10. 4.11.	Gute Heilung p. p.	30.X.1894. Untersuchung in d. Sprechstunde. Desc. vag. ant., retroflexio uteri; tumor tubo- ovarialis.- Unterleibsschmerzen.

In 2

Sitzungen
operiert.

Zugleich
Emmet.
In 2
Sitzungen
operiert.

Lite. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Con- plications	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
165	1888 71.	Frau F. B., 49j., V p.	Prol. uteri et vag. totalis; Elongatio colli.	"		15.2.73.	Gute Heilung p. p.			
166	1888	Frau M. St., 63j.	Prol. uteri et vag. totalis.	"		21.3.74.	Gute Heilung p. p.			
167	1888	Frau M. R., 41j.	Prol. uteri et vag. totalis.			26.3.194.			† am 9. XI. 1892. Laut briefl. Mitteilung der Tochter nach Heben eines schweren Korbes völliges Reci- div, plötzlich im Moment des Hebens eintretend und binnen wenigen Tagen zum Tode füh- rend.	
168	1888 26.	Frau W. P., 54 j.	Prol. uteri et vag. totalis.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt.	13.4.294.	Heilung p. primam.		25. VII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva für 2 Finger klaffend; Damms gut erhalten; in der Scheide ein uraltet, scheusslich riechendes, stark inkrustiertes Pessar, das stark Decubitus erzeugt hat und sehr fest sitzt; dieses Pessar aus Kupferdraht mit grösster Mühe entfernt. Kein Vorfall.	

1701888	Led. B. K., 105. 22j., I p.	Prol. uteri et vag. totalis.	Dr. Keil.		2.7. 19.7.	Gute Heilung bis auf einige durchge- schnittene Nähte.		Aufenthalt unbekannt.	ger klaffend; beim starken Pres- sen tritt in die rima eine klei- ne Rectocele; vorders Wand gut. Kein Vorfall. Uterus stark involviert. — Wohlbefinden.
1711888	Frau A. St., 47 j.	Prol. uteri et vag. totalis.	Dr. Keil.	Glatt.	7.9. 25.9.	Gute Heilung p. p.			21. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Wegen Mangel an Schonung bald p. op. Recidiv, wenn auch nicht so schlimm als vor der Operation.
1721888	Frau M. M., 53 j.	Prol. uteri et vag. totalis.	Dr. Keil.		20.9. 6.10.	Gute Heilung.			17. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva für 1 Finger klaffend; beim Pressen legt sich die vordere Wand hinein. Uterus stark involviert, hochstehend. Sehr gutes Resultat.
1731888	Frau B. R., 28 j.	Prol. uteri et vag. totalis.	Dr. Keil.		9.11. 25.11.	Gute Heilung p. p.	1 Abort, 1 leichte, spontane Geburt.		23. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Seit einigen Jahren hat sich der Vorfall wieder gezeigt, besonders seit der Entbindung. Kann nur leichte Arbeit thun.

Lfd. No.	Jahr.	Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Operat.	Entlassung.	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
174	1889	31.	Led. P. B., 30j. II p.	ProL. uteri et vaginae, Elong. colli.	Dr. Fahrenbach.	14. V. Seit einigen Tagen incontinentia urinæ. — Nähte entfernt.	3.5.	18.5.	Gute Heilung p. p.	Juli 1891 eine Geburt, schwer, mit Forceps beendet.	23. VIII. 1891. Desc. vag. ant. 6. I. 1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva für 3 Finger klaffend; die ganze vordere Wand prolabierte beim Pressen; die hintere steht gut; auch der Uterus ist etwas prolabierte; Damm länge 6 cm. Druck nach unten, Kreuzschmerzen; Unfähigkeit, schwere Arbeit zu thun. — Trägt Bandage.	Ende des Jahres 1886 schon einmal kolporrhaphiert.
175	1890	360.	Frau Th. K., 39j., V p.	ProL. uteri et vag. totalis; Elong. colli, Erosio portio-nis.	G.-R. Kaltenbach.	Fieberfrei. — Am 29. I. arterielle Nachblutung aus einer durch Auseinanderweichen der Wundränder entstandenen Gewebslücke an der vorderen Wand. Umstechung.	17.1.	5.2.	Gute Heilung p. p.		19. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kein Vorfall; doch nicht ganz frei von Beschwerden; kann nur leichte Arbeit leisten.	

1771889	Frau A. W. 83. 26j., I p., I Ab.	Inv. vag. to- talis; Elong. colli, Erosio portionis.	Dr. Fahren- bach.	ung der Damm- und vorderen Scheidennähte	11. VI. Die letzten 3 Tage wegen starker Sekretion va- ginaler Spülung mit Borsäure- lösung. An der comm. post. klaffen die Wundflächen mässig; nach- dem die Fäden durchge- schnitten sind. Hiernächst er- folglose Se- kundärnaht.	11. 16. 16. 6.	Gute Heilung p. p. bis auf die klaffende Wundfläche am Scheiden- eingang.	p. primam.	leichte Ge- burt; im Anschluss daran En- dometritis puerpera- lis (?).	18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kein Recidiv. Kann alle Ar- beit thun, empfindet aber bei starken Anstrengungen Schmer- zen in beiden Seiten.	Ausser der Kolpoperi- neorrh- phia noch links Ent- fernung eines quer- gestellten Ovals.
1781889	Frau E. A., 168. 50j., IX p.	Inv. vag. tota- lis, Rectocele; Rupt. perin. inc. invet., Elong. colli.	Dr. Fahren- bach.	Glat.	29. 7. 16. 8.	Heilung p. p. Erhebliche Verengerung. Da aber der Damm rel. kurz ist, ragt die hintere Scheidenwand wieder in den introitus vor.	26. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Gar keine Beschwerden. Kein Vorfall.				

Lfd. No.	Jahr. Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorralls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen.
179	1889 236, 39j., VI p.	Frau Th.B.	Prol. vag. ant., Hypertrophia portionis; Ul- cus decub. vag. ant.	Dr. Keil.	Am Operati- onstage 38,4 Abendtemp., sonst normal.	23.9. 8.10.	Heilung p. primam. Sehr gutes Resultat.	9. XI. 1891 eine schwere Geburt, dabei Dammriss, der ge- näht wird.	31. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Gleich nach der Operation wie- der Drängen nach unten. Seit der Entbindung ist der Vorrall wiedergekehrt. — Kann trotz- dem alle Arbeit verrichten.	
180	1889 257, 42j., IX p.	Frau A. R.	Inv. vag. tota- lis; Cystocele; Rectocele; Hy- per rophia portionis; Elongatio colli.	Dr. Fahren- bach.	Am 12. Tage 38,1 Abend- temp., sonst normal. Vagi- nale Spülun- gen mit Bor- säurelösung.	18.10. 31.10.	Heilung p. primam. Vorzügliches Resultat.		18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Bis Oktober 1893 völlig arbeits- fähig und beschwerdefrei. Seit- dem bisweilen Drängen nach unten, doch kein Prolaps. Gegen- wärtig schwer magenkrank.	
181	1889 263.	Frau A. B.	Desc. vag. ant. et post.; Rupt. perin. inc. in- vet., Metritis colli, Ectropi- um mucosae cerv.	G.-R. Kalten- bach.	Am Operati- onstage 38,0 Abendtemp., sonst normal.	22.10. 7.11.	Heilung p. primam. Vorzügliches Resultat.		18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Völlige Heilung des Vorralles, jedoch Klagen über periodisch auftretende Kopfschmerzen mit Erbrechen, welche auf die Ope- ration zurückgeführt werden.	
182	1890 83, 38j., IV p.	Frau A. R.	Prol. vag. ant. et post., Desc. totalis, Dammriss	Prof. v. Herrff.	Glatt.	21.5. 6.6.	Heilung p. primam. Vorzügliches Resultat.		27. IX. 1892. Sehr gutes Resultat. — Retroflexio uteri. — Hodge. — 18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung.	

1831890	Frau E. B., 176. 29 j., II p., I Ab.	ProL. vag. ant., et post., Desc. uteri, Elong. colli, Lacer. cerv. dupl.	Dr. Fischer.	3 mal 38, 1 Abendtemp., sonst normal. Vom 1.-5. VIII. Nähte entfernt.	21. 7. 7. 8.	Heilung p. primam. Gutes Resultat	2 Geburten davon die erste schwer mit Dammriss, der genäht wird.	26. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit den 2 Entbindungen wie- der die alten Beschwerden. — Trägt Binde.	hidenreute; Gründe dafür nicht angegeben.
1841890	Frau C. V., 248. 54 j., I p.	ProL. vag. ant. et post., Cys- cele. Rectocele Rupt. perin. inc. invet., Elong. colli, Hypertrophie, portionis.	"	2 mal abends 38, 1: sonst glatt. Am 11. Tage Ent- fernung der Perinealnähte	2. 9. 27. 9.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		20. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kurze Zeit p. op. wieder Drän- gen nach abwärts, das jedoch bei Einnahme der Rückenlage sofort verschwindet. Kein Pro- laps, fühlt sich gegen früher sehr wohl.	
1851890	Frau W. R., 302. 46 j., III p.	Inv. vag. ant., ProL. uteri, Rupt. perin. inc. invet., Elong. colli, Ulcus decub. vag. ant.	G.-R. Kalten- bach.	Anfangs Bronchitis in- folge der Nar- kose. Am 11. Tage Damm- nähte entfernt	6. 11. 22. 11.	Heilung p. primam.		23. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Prolaps geheilt. Kann jedoch nur leichte Arbeit thun.	
1861890	Frau C. W., 413. 47 j., X p., II Ab.	ProL. vag. ant., Desc. vag. post., Retrov. uteri, Elong. colli infra- vag., Erosio port. Fic. decub. vag. aut., Rupt. perin. inc. invet.	Prof. v. Herff.	Glatt. Am 1. III. Damm- nähte entfernt	? 19. 2. 7. 3.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		20. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Heilung. Wohlbehalten. Keiner- lei Beschwerden.	

Lfd. No.	Jahr.	Monat.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Operat.	Tag der Entlassung	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
187	1891	126.	Led. F. L., 25 j., I p.	Inv. vag. totalis, Prol. uteri incompl., Elong. colli, Erosio portio-nis, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Fischer.	Glatt. Am 10. Tage Damm-nähte entfernt	6.7.	20.7.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		27. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Völlige Heilung. Gar keine Beschwerden. Kann schwere Arbeit leisten.	
188	1891	170.	Fran C. W., 54 j., IV p., XI. Ab.	Prol. uteri et vaginae, Elong. colli, Rupt. perin. inc. invet.	"	Am 2. Abend p. op. 38,4; Am 3. Abend p. op. 38,0. Vaginale Spülungen. Am 10. Tage Damm-nähte entfernt	31.8.	15.8.	Gute Heilung p. p., am Damm mässige Nekroseubildung		20. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Die hintere Wand ist total in ihrem unteren Drittel prolabierte, die vordere in den mittleren Partien. Uterus stark involviert. Introitus stark erschlaft, so dass man die halbe Hand bequem einführen kann. Keine Rectocele.	
189	1891	298.	Frau H. B., 44 j., III p., I Ab.	Prol. vag. ant. et post., Desc. et retroflexio uteri; Elong. colli, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Briskien.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	18.11.	2.12.	Heilung p. primam. Gutes Resultat		3. XI. 1892. Resultat gut. — Pruritus vulvae. 19. XII. 1894. Brief. Mitteilung. Vor u. nach der Menstruation starker Fluor albus, sonst völliges Wohlbefinden. Gute Heilung.	

I Abt.	Elong. coli., erosio portio- nis.				sonst heberlos. 11. III. Furun- kulos. Am 10. Tage Nähte entfernt.		Vorfall ist nicht wieder- gekehrt. Seit einiger Zeit Gefühl von Drängen bei schwerer Arbeit.
1911892	Frau P. G., 431. 54j., VII p.	Desc. vag. ant. et post., Cystocele; Prol. uteri incompl., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Briskén.		7.3. 22.3. Glatt. Am 10. Tage Nähte ent- fernt.	Heilung p. primam. Gutes Resultat	21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit kurzer Zeit Drängen nach unten; auch soll sich ein mäs- siges Vortreten der Vaginal- wand aus der rima bemerkbar machen. Kann aber alle Arbeit thun.
1921892	Frau L. E., 106. 50j., I p. III Ab.	Prol. vag. ant., Desc. uteri, Lacerat. cerv. dupl., Tumor sacralis(caries artic. sacro- iliac.).	Dr. Kupfer- berg.	8.7. 24.7. Fieberlos.		Gute Heilung p.p. Am Damm oberflächliche Nekrosen- bildung.	7. IX. 1892. Nähte entfernt. Gutes Resultat.
1921892	Frau P. N., 156. 52j., X p.	Desc. vag. præc. post., Elong. coli., Endometritis, Hypertrphia portionis, Rupt. perin. inc. invet., Ekzema vulvae.	Dr. Voigt.	Vom 4.-6. Tag Temperatur- steigerungen bis 38,8; ver- bunden mit Leibschmerz u. Durchfall. Am 9. Tage Entfernung der Nähte.	16.8. 29.8. p. p.	Gute Heilung p. p.	24. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Trotz schwerer körperlicher Anstrengung völliges Wohl- befinden, dauernde Heilung.

Lfd. No.	Jaht, Journ. No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name de- Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
194	1893 289.	Frau E.K., 36j., IV p. I Ab.	Desc. vag. ant. et post., Cystocele; Prol. uteri incompl.; Retroversio uteri; Elong. colli; Ectrop. cerv. muc.; Lacerat. cerv. lat. dext.	Dr. Kupfer- berg.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	15.2.28.2.	Heilung p. primam.		3.VI.1893. Recidiv der vorderen Wand. 31.XII.1894. Briefl. Mitteilung. Nicht beschwerdefrei. Seit 1 $\frac{1}{2}$ Jahren Recidiv. Vergeblich mit Pessar behandelt.	
196	1893 27. 51j., VI p.	Frau W.K., 51j., VI p.	Inv. vag. ant. et post., Desc. et retro- versio uteri; Elong. colli, Hypertrophia portionis.	"	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	14.4.27.4.	Heilung p. primam.		14.I.1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Stark. Descensus der vorderen, geringer der hin- teren Wand. Elong. colli in- fravaginalis. — Nicht beschwer- defrei. Zur Operation bestellt.	
196	1893 209. 46j., VIII p. IV Ab.	Frau A.St., 46j., VIII p. IV Ab.	Inv. vag. ant. et post., Cystocele; Rectocele; Prol. uteri totalis, Retro- versio uteri; Ectrop. cerv.	Dr. Hermes	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	9.10.22.10.	Heilung p. primam. Am unteren Wundwinkel hat eine Naht tief ein- geschnitten.		25.XII.1894. Briefl. Mitteilung. Drängen nach unten, beutel- förmige Verbuchung d. Vagina. Kann keine schwere Arbeit thun.	Recidiv- operation nach Kol- porrh. ant. et Kolpo- perin. vom 11.X.1889.

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
200	1889 391	Frau A.G., 54j., V p. I Ab.	ProL. uteri to- talis; Elong. coli, Ulcus portio- nis.		Am 12. III. Entfernung d. Nähte, die fast alle durch- geschnitten sind; die An- frischungs- fläche der Kolporrh. klaubt ausein- ander.—Subli- matpülungen Am 27. III. Secundärnaht. Am 7. IV. Ent- fernung der Dammnähte.	4.3. 14.4.	Nahezu lineare Heilung bis auf 2 kleine, linsengrosse Stellen, die mit guten Granu- lationen be- deckt sind.			
201	1888 13. 60j., III p.	Frau W.F.	Desc. vag. ant. et post., Elong. coli.		Glat. Am 10. Tage Nähte entfernt.	9.1. 27.1.	Gute Heilung p. p.			18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung Infolge schwerer Arbeit seit 4 Jahren wieder Hervortreten beider Scheidenwände nebst anderen Vorfalbeschwerden. Trägt seitdem wieder Pessar; fühlt sich sehr wohl. 24. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Gar keine Beschwerden. Völlige
202	1888 144.	Frau Th.R. 47j.	ProL. vag. ant. et post. Elong. coli, hermische Vor- stülpung des	G.-R. Kalten-	Glat.	11.7. 30.7.	Gute Heilung p. p.			

11. Abt. Elong. coli.	mehrte Sekretion. Carbolspüln. Am 10. Tage Klaffen der hinteren An- frischungs- fläche. Weitere Spü- lungen. Gute Granulationen Fieberfrei. Mässige Sekre- tion; Neural- gie im Kopf. In der Mitte des Damms sind 2 Nähte durch- geschnitten. Am 6. Tage p. op. Frösteln, Kopfweh und die übrigen Anfangssymp- tome einer In- fection. Ver- schlimmerung von Tag zu Tag trotz aller Gegen- massregeln.	31.7.18.7.	Gute Heilung P. p.	2 schwere Geburten, eine davon Zwillings- geburt.	21. XII. 1894. Briefl. Mittheilung. Im Anschluss an die Geburten ist das Leiden wiedergekehrt u. macht viele Beschwerden, namentlich erst seit einem Jahr.	Kolporrh. anterior wird als Nachopera- tion gemacht.
204 1889 Frau L. B., 166, 33j., IV p. I Ab.	Inv. vag. tota- lis, Cystocele; Elong. coli; Ulcera vag. ant.	Dr. Keil.				
205 1889 Fr. O. Sch., 136, 32j.	Inv. vag. tota- lis, Elong. coli; Rupt. perin. inc. invet.	R.-G. Kalten- bach.	10.7.18.7.	+		

Lfd. No.	Jahr, Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
206	1889 141.	Fran C. A., 29j., IV p.	Inv. vag. tota- lis. Rectocele; Elong. colli; Rupt. perin. inc. invet.		Vom 21. VII. an Pneumonia sin.; am 1. Tag einige Nähte entfernt.	19.7. 1.8.	Heilung p. p. bis auf 2 dichte unterhalb der commiss. post. durchgeschnit- tene Nähte.	14. VI. 92 keine Geburt (leichte Entwickelung eines leb Kindes Jahre mit Aus- gangs- forceps, ohne Ver- letzungen).	31. XII. 1894. Untersuchung in der Sprechstunde. Prol. vag. ant. et post. totalis; Oophoritis, Perioophoritis dextra. — Pessar (Schilling). Das Recidiv soll 2 Jahre p. op. eingetreten sein.	
207	1889 145.	Lecl. L. F., 28j., I p.	Inv. vag. tota- lis, Cystocele, Elong. colli; Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Fahren- bach.	Am 3. Tage p. op. 38.2 Aberdtemp., sonst völlig fiebertfrei.	16.7. 30.7.	Gute Heilung p. p.		Wegen Recidivs am 4. III. 1890 zum 2. Male operiert.	
208	1889 212.	Frau F. K., 40j., V p. II Ab.	Inv. vag. tota- lis, Elong. colli.	Dr. Keil, Dr. Fahren- bach.	Vom 4.—11. Tage p. op. 38,0—39,8 Temp. infolge von entstan- dener Para- metritis dext. et post. — Va- cinalsnähen	30.8. 17.9. 4.10.	Gutes Resultat Rechts neben dem Uterus ein extraperitone- ales, gänse- eigrosses Exsu- dat.			

209	1890	Led. C. B., 430. 45j., II p.	Prol. vag. ant. et post., Elong. colli.	G.-R. Kalten- bach.	Operationstag 38,0 Abend- temp., sonst glatt.	6.3. 21.3.	Heilung p. primam. Recht gutes Resultat.	18. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Seit 2 Jahren wieder Beschwer- den und gegenwärtig Prolaps beider Vaginalwände, wie vor der Operation. — Pessar. Muss schwer arbeiten. Wegen Recidivs am 2. IV. 1894 zum 2. Male operiert. (cf. No. 27).
210	1890	Fran M. O., 28. 47j., VI p.	Prol. vag. ant. et post., Cystocele, Elong. colli, Erosio portio- nis.	Dr. Fischer	Glatt.	11.4. 30.4.	Per primam. Gutes Resultat	
211	1890	Frau W. B., 78. 45j., I p.	Inv. vag. tota- lis, Cystocele; Rectocele; Prol. uterine, Elong. colli, Ulcus portio- nis.	Dr. Fischer	5 mal abendl. Temperatur- erhebungen bis 38,2; sonst glatt. Vom 11. Tage an Nähte entfernt.	19.5. 5.6.	Per primam. Sehr gutes Resultat.	
212	1890	Fran C. B., 112. 45j., V p., III Ab.	Inv. vag., Cys- tocele, Recto- cele, Prol. uteri totalis, Elong. colli, Ulcus decub. vag. post., Rupt. perin. inc. invet.	G.-R. Kalten- bach.	Fieberfrei. Mässige Se- kretion. Am 11. Tage Näthe entfernt.	11.6. 23.6.	Per primam. Gutes Resultat	22. V. 1894. Dec. vag. ant., Vul- varöffnung zu gross. 21. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Starke Beschwerden. Seit 1 Jahre nahe- zu völliges Recidiv.

Lfd. No.	Jahr.	Journal.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vortalls, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Operat.	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen.
213	1890	Frau A. B., 251.49j., IX p.	ProL. uteri et vag. totalis, Cystocele, Rectocele; Elong. colli, Ulcus portionis.	Dr. Fischer	Am 2. Tage p. op. 38,0 Abendtemp., sonst fieberfrei. Am 11. Tage Dammnähte entfernt; übelriechender Ausfluss. Lysol.	19.9.7.10.	Gute Heilung p. p.	20. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Gar keine Beschwerden. Vorfall geheilt.			
214	1890	Frau R. M., 346.52j., IX p.	ProL. vag. ant. et post., Elong. colli, Hyper-trophia portionis, Lacerat. cerv. dupl. Rupt. perin. inc. invet.		Fieberfrei. 14. XII. Dammnähte entfernt; 16. XII. Foetide Sekretion. — Kali hyp. 21. XII. Drahtnähte z. T. entfernt. Vom 2.—6. Tage 38,0 ohne alle Beschwerden. Vom 8. VI. an Entfernung der Nähte.	3.12.24.12.	Lineare Heilung p. p.	24. XII. 1891. Sporn nicht verheilt. Wegen Pessar. 10. IX. 1892. Desc. vag. ant. Achterpessar.			
215	1891	Frau A. L., 67.32 j., II p.	ProL. uteri et vag. totalis, Cystocele; Elong. colli, Ulcus portionis.			28.5.18.6.	Heilung p. p.	25. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Der Vorfall ist 3 Monate p. op. zurückgekehrt und besteht in demselben Grade wie früher.			

Elong. colli, Erosioorif ext., Rupt. perin. inc. invet.		entfernt.	Heilung	5 Aborte.	19.I.1895. Brief. Mitteilung. Seit Mai 1893 nach Frühgeburt (n. VII.) faustgrosser Prolaps. Keine Beschwerden.
2171881Frau B.W., 227.39j., XI p. II Ab.	G.-R. Kalten- bach.	Am 2. Tage p. op. 38,0 Abendtemp., am 8. Tage p. op. 38,1 Abendtemp., sonst glatt.	Gute Heilung p. p.		
2181891Fr. M.Sch., 246. 28j., I p. I Ab.	Prof. v. Herff.	Am 2. Tage p. op. 38,4 Abendtemp., sonst fieberlos. Am 19. X. Dammnähte entfernt.	Gute Heilung p. p.		22.XII.1894. Brief. Mitteilung. Während der menses starkes Drängen nach abwärts. Kein Vorfall. Nach Aussage des be- handelnden Arztes retroflexio uteri; Pessar vergeblich ap- pliziert.
2191891Frau J.L., 265. 44j.	G.-R. Kalten- bach.	Am 1. u. 2. Abend 38,1; sonst fieberlos.	Gute Heilung p. p.		20.XII.1894. Brief. Mitteilung. Vorfall gänzlich beseitigt; frei von allen Beschwerden. Wohl- befinden.
2201892Fr. W.Sch., 390.41j., III p.	Dr. Briskren	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	Gute Heilung p. p.		20.I.1895. Untersuchung in der Sprechstunde. Vulva f. I Finger durchgängig; kein Prolaps. Uterus sinistro-retroflektiert, klein. — Bisweilen in continentia urinae; sonst keinerlei Beschwer- den.

Lfd. No.	Jahr, Jour.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalls, Com- plicationen	Name des Ope- rateurs	Heilungs- verlauf	Tag der Operat.	Entlassungs- befund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Be- merkungen
221	1892 396.	Frau F.K., 48j., II p.	Prol. uteri et vaginae, Elong. coli, Rupt. perin. inc. invet.	Prof. v. Herff.	Fieberfrei. Hämatombeid. Labien.	12.2.25.2.	Nicht linear geheilt; kleine Vagino- perinealfistel.		21. IV. 1892. Entfernung von Nähten; Dammfistel noch vor- handen. 27.XII.1894. Briefl. Mitteilung. Trotz schwerer Arbeit völliges Wohlbefinden. Keine Prolaps- beschwerd. Bisweilen Schmerz- empfindungen durch einige noch liegende Nadeln.	
222	1892 407.45j., IV p.	Frau B.Z., 407.45j., IV p.	Prol. uteri et vaginae, Cys- tocele, Recto- cele; Elong. coli, Erosio portion., La- cerat. cerv. lat. sin.	Dr. Briskren	Am Abend des Operations- tages Häma- tom am Peri- toneum, am 2. Abend 38,0; dann noch 3 mal geringe abendliche Temperatur steigerungen; am 14. Tage 2 Furunkel. Incision.	20.2.1902.	Nähte am Damm z. T. durchge- schnitten. Pe- rineovaginal- fistel. Sonst gutes Resultat		6. IX. 1892. Fistel noch vor- handen; ungemein enge Scheide. 4. IX. 1893. Desc. uteri; Fistel noch vorhanden. 25. XII. 1894. Sprechstunde. Vulva ballonartig vorgetrieben, für 1 Finger durch- gängig. Dammlänge 9 cm; 3 cm von der Commissur erben- grosse Perinealfistel, 1 cm wei- ter Dorsalzweite Fistel, 1 1/2 cm im Durchmesser, aus der eine herniöse Ausstülpung der hin- teren Vaginalwand heraussteht, einer Rectocele angehörig. Vor- dere Wand hängt schlaff gegen den Beckenboden herab. Uterus	

224	1892	Fr. M. Sch., 456. 34 j., II p.	ProL. uteri et vaginae inc., Elong. colli, Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Briskien	Glatt.	26.3. 11.4.	Gute Heilung p. p.	22. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Wohlbefinden. Kann alle Arbeit thun. Bei grösserer Anstren- gung und bei vielem Gehen soll sich die Gebärmutter wie- der senken.
225	1892	Frau F. M., 175. 50 j., IV p. II Ab.	Inv. vag. ant. Cystocoele; ProL. uteri inc. Elong. colli su- pravag. Rupt. perin. int. invet.	Prof. v. Herff.	Fieberfrei. I. X. Ödem eines Catgut- stichkanals an der linken kleinen Labie. Dammnähte entfernt. Glatt. Am 20. XI. Nähte entfernt.	22.10. 6.10.	Gute Heilung p. p. Mässige Einziehung am Damm.	
226	1892	Frau J. Sch., 210. 28 j., II p. II Ab.	Inv. vag. ant. et post., Desc. uteri, Elong. colli, Hyper- trophia por- tionis.	Prof. v. Herff.	Glatt. Am 20. XI. Nähte entfernt.	11.11. 26.11.	Gute Heilung p. p.	
227	1892	Frau R. O., 221. 44 j., VII p.	ProL. uteri totalis, Elong. colli supravag.	G.-R. Kalten- bach.	Glatt. Am 4. XII. Nähte entfernt.	25.11. 10.12	Gute Heilung p. p.	7. I. 1895. Briefl. Mitteilung. Gar keine Beschwerden. Vor- fall ist geheilt.

Lfd. No.	Jahr.	Journ.-No.	Name, Alter, Zahl der Geburten	Grad des Vorfalles, Complicationen	Name des Operateurs	Heilungsverlauf	Tag der Operat.	Entlassungsbefund	Spätere Geburten	Späteres Befinden	Bemerkungen
228	1893	Frau W.F., 248.36j., VII p.	Prol. vag. ant., et post., Desc. uteri Elong. colli supravag., Hypertrophia. port., Lacer. cerv. lat. sin.	Dr. Voigt.	Glatt. Am 9. Tage Nähte entfernt.	13.1.27.1.	Gute Heilung p. p.	Mitte April 1894 eine schwere Geburt, dabei Dammriss, nicht genäht.	29. VII. 1893. Gutes Resultat.		
229	1894	Frau E.W., 328.34j., III p.	Prol. uteri et vag. totalis, Elong. colli, Decub. vag., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Hermes.	Glatt. Am 10. Tage Nähte entfernt.	11.2.24.2.	Gute Heilung p. p.		27. XII. 1894. Untersuchung in d. Sprechstunde. Vulvaröffnung für 4 Finger klaffend; vagina in ihrem unteren Drittel ringförmig prolabiert, besonders rechts. Mässige Rectocele. Portio steht im Beckenausgang. Uterus stark verdickt, gravid. m. II (?). Einige Wochen p. op. wieder Drängen und Senkung. Kann nicht alle Arbeit leisten.		
230	1894	Fr. A Sch., 290.39j., III p.	Desc. vag. ant., et post., Rupt. perin. inc. invet.	Dr. Bücheler.	Glatt. Am 8. Tage Dammnähte entfernt.	12.1.25.1.	Gute Heilung p. p. bis auf einige am Damm durchgeschnittene Nähte.	23. XII. 1894. Briefl. Mitteilung. Kann nur leichte Arbeit thun. Sout Wohlbe finden. Vorfal geheilt.			

VI. Perineoplastik.

tritt d. menses. 4. II. Am Scheiden- Dammwinkel 2 Nähte durch- geschnitten, daselbst Nekrose. 6. II. Nähte entfernt, ge- ringe Eiterung.	Glatt, <
--	---

Am Schlusse meiner Arbeit sei es mir noch gestattet, Herrn Professor Dr. Fehling für die gütige Überlassung des Themas und die grosse Liebenswürdigkeit, mit welcher er mich jederzeit unterstützte, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. Zugleich auch danke ich herzlich Herrn Professor Dr. von Herff für den freundlichen Rat, den er mir bei der Anfertigung der Arbeit zu teil werden liess, und für seine sonstigen überaus grossen Bemühungen.

Litteratur.

Hegar u. Kaltenbach. Die operative Gynaekologie. 1886.

Fehling. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. 1893.

Hofmeier, Grundriss der gynaekologischen Operationen
1892.

Frommel. Jahresbericht über die Fortschritte auf dem
Gebiete der Geburtsh. und Gynaek.; 1892 u. 1893.

Leopold. Arbeiten aus der Königl. Frauenklinik in
Dresden. II. Bd. 1895.

Centralblatt für Gynaek. 1886, 1889, 1892.

Lebenslauf.

Am 26. März 1870 wurde ich, Albert Max Kieme, evangelischer Confession, als Sohn des verstorbenen Rentiers Albert Kieme zu Heygendorf im Grossherzogtum Sachsen-Weimar geboren. Den ersten Schulunterricht genoss ich in meinem Heimatsorte, besuchte sodann von Ostern 1881 bis 1885 das Gymnasium zu Eisleben, von Ostern 1885 an das Gymnasium zu Sangerhausen; letzteres verliess ich Michaelis 1890 mit dem Zeugnis der Reife, um mich dem Studium der Medizin zu widmen. Zu diesem Behufe bezog ich die Universität Halle und verblieb an derselben das erste Semester. Das Sommersemester 1891 lag ich meinen Studien in Tübingen ob. Michaelis 1891 kehrte ich wieder an die hiesige Universität zurück, der ich von da ab nunmehr bis jetzt angehört habe. Am Schlusse des vierten Semesters, am 26. Juli 1892, bestand ich die ärztliche Vorprüfung.

Es war mir vergönnt, von Mitte August 1893 bis Anfang Februar 1894 in der medizinischen Klinik des Herrn Geheimrat Weber, ferner vom 1. März 1894 bis 1. Juni 1894 in der stationären chirurgischen Klinik des Herrn Prof. von Bramann, und vom 1. August bis 1. November 1894 in der geburtshülflich-gynaekologischen Klinik des Herrn Prof. Fehling als Volontär meine praktische Ausbildung zu fördern, wofür ich diesen Herren besonderen Dank schuldig bin.

Am 26. März 1895 bestand ich das Examen rigorosum.

Als Lehrer während meiner Studienzeit verehere ich dankbar die Herren Professoren und Dozenten:
in Tübingen:

Frörriep, Henke, L. Meyer, Vöchting;

in Halle:

Ackermann, Behring, Bernstein, v. Bramann,
Bunge, Dissé, Eberth, Eisler, Fehling,
Grenacher, Harnack, v. Herff, v. Hippel, Hitzig,
Kaltenbach†, Knoblauch, Kromayer, Leser,
v. Mering, Oberst, Pott, Renk, Schwartzé,
Volhard, Weber, Welcker.

Thesen.

I.

Bei den noch mitten in der Fortpflanzungsperiode stehenden Frauen ist eine Prolapsoperation, wenn irgend möglich, so lange hinauszuschieben, bis keine Schwangerschaften mehr zu erwarten sind.

II.

Die Uterustamponade ist zur Stillung atonischer Nachgeburtsblutungen nur im äussersten Notfalle gestattet.

III.

Bei Hautmilzbrand ist eine exspektative Behandlung im Allgemeinen der Incision des Karbunkels vorzuziehen
